

ANEXO A: DESGLOSE POR ESTADO DE LA TASA DE RESPUESTA DE LA ENCODAT 2016-2017

Tasas de respuesta colectiva por estado. Incluye viviendas donde se aplicó el cuestionario *Tradicional* (ENA-2011)

| | Muestra original | | | Muestra Total | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | Visitadas | No visitadas | Tasa Respuesta | Visitadas | No Visitadas | Tasa Respuesta |
| 01 Aguascalientes | 2 030 | 159 | 93 | 2 221 | 199 | 92 |
| 02 Baja California | 2 146 | 32 | 99 | 2 229 | 32 | 99 |
| 03 Baja California Sur | 2 057 | 8 | 100 | 2 127 | 8 | 100 |
| 04 Campeche | 2 144 | 45 | 98 | 2 180 | 45 | 98 |
| 05 Coahuila de Zaragoza | 2 081 | 108 | 95 | 2 184 | 108 | 95 |
| 06 Colima | 2 164 | 9 | 100 | 2 176 | 9 | 100 |
| 07 Chiapas | 2 076 | 140 | 94 | 2 239 | 140 | 94 |
| 08 Chihuahua | 1 922 | 322 | 86 | 2 185 | 393 | 85 |
| 09 Ciudad de México | 2 093 | 93 | 96 | 2 313 | 118 | 95 |
| 10 Durango | 1 955 | 193 | 91 | 2 151 | 226 | 90 |
| 11 Guanajuato | 2 088 | 107 | 95 | 2 186 | 107 | 95 |
| 12 Guerrero | 2 017 | 184 | 92 | 2 238 | 184 | 92 |
| 13 Hidalgo | 2 163 | 27 | 99 | 2 225 | 27 | 99 |
| 14 Jalisco | 2 028 | 162 | 93 | 2 342 | 162 | 94 |
| 15 México | 2 140 | 50 | 98 | 2 196 | 50 | 98 |
| 16 Michoacán de Ocampo | 2 009 | 181 | 92 | 2 231 | 181 | 92 |
| 17 Morelos | 2 140 | 42 | 98 | 2 196 | 81 | 96 |
| 18 Nayarit | 2 046 | 125 | 94 | 2 190 | 139 | 94 |
| 19 Nuevo León | 1 935 | 254 | 88 | 2 194 | 266 | 89 |
| 20 Oaxaca | 2 089 | 103 | 95 | 2 165 | 120 | 95 |
| 21 Puebla | 2 059 | 131 | 94 | 2 171 | 137 | 94 |
| 22 Querétaro | 2 063 | 126 | 94 | 2 191 | 126 | 95 |
| 23 Quintana Roo | 2 024 | 164 | 93 | 2 325 | 168 | 93 |
| 24 San Luis Potosí | 2 129 | 50 | 98 | 2 222 | 50 | 98 |
| 25 Sinaloa | 2 113 | 64 | 97 | 2 197 | 97 | 96 |
| 26 Sonora | 2 181 | 8 | 100 | 2 216 | 8 | 100 |
| 27 Tabasco | 2 033 | 149 | 93 | 2 157 | 149 | 94 |
| 28 Tamaulipas | 2 157 | 33 | 98 | 2 203 | 33 | 99 |
| 29 Tlaxcala | 2 187 | 1 | 100 | 2 187 | 1 | 100 |
| 30 Veracruz de Ignacio de la Llave | 2 071 | 88 | 96 | 2 213 | 88 | 96 |
| 31 Yucatán | 2 053 | 139 | 94 | 2 317 | 139 | 94 |
| 32 Zacatecas | 2 189 | -- | 100 | 2 189 | -- | 100 |
| Nacional | 66 582 | 3 297 | 95 | 70 756 | 3 591 | 95 |

Tasas de respuesta de hogar por estado


| Entidad | Completas | No viviendas | No conseguidas | Total | Tasa Respuesta |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------|----------------|
| 01 Aguascalientes | 1 707 | 48 | 293 | 2 048 | 85 |
| 02 Baja California | 1 807 | 62 | 199 | 2 068 | 90 |
| 03 Baja California Sur | 1 768 | 52 | 169 | 1 989 | 91 |
| 04 Campeche | 1 717 | 69 | 242 | 2 028 | 88 |
| 05 Coahuila de Zaragoza | 1 652 | 88 | 289 | 2 029 | 85 |
| 06 Colima | 1 679 | 40 | 270 | 1 989 | 86 |
| 07 Chiapas | 1 712 | 42 | 215 | 1 969 | 89 |
| 08 Chihuahua | 1 741 | 106 | 205 | 2 052 | 89 |
| 09 Ciudad de México | 1 760 | 86 | 346 | 2 192 | 84 |
| 10 Durango | 1 747 | 60 | 192 | 1 999 | 90 |
| 11 Guanajuato | 1 758 | 43 | 212 | 2 013 | 89 |
| 12 Guerrero | 1 847 | 75 | 143 | 2 065 | 93 |
| 13 Hidalgo | 1 828 | 66 | 140 | 2 034 | 93 |
| 14 Jalisco | 1 724 | 50 | 426 | 2 200 | 80 |
| 15 México | 1 661 | 110 | 331 | 2 102 | 83 |
| 16 Michoacán de Ocampo | 1 821 | 65 | 137 | 2 023 | 93 |
| 17 Morelos | 1 762 | 143 | 204 | 2 109 | 90 |
| 18 Nayarit | 1 777 | 43 | 178 | 1 998 | 91 |
| 19 Nuevo León | 1 598 | 116 | 409 | 2 123 | 80 |
| 20 Oaxaca | 1 705 | 27 | 198 | 1 930 | 90 |
| 21 Puebla | 1 718 | 82 | 208 | 2 008 | 89 |
| 22 Querétaro | 1 731 | 47 | 229 | 2 007 | 88 |
| 23 Quintana Roo | 1 733 | 122 | 364 | 2 219 | 83 |
| 24 San Luis Potosí | 1 776 | 77 | 198 | 2 051 | 90 |
| 25 Sinaloa | 1 775 | 34 | 198 | 2 007 | 90 |
| 26 Sonora | 1 797 | 97 | 168 | 2 062 | 91 |
| 27 Tabasco | 1 800 | 50 | 161 | 2 011 | 92 |
| 28 Tamaulipas | 1 643 | 119 | 305 | 2 067 | 84 |
| 29 Tlaxcala | 1 829 | 52 | 129 | 2 010 | 93 |
| 30 Veracruz de Ignacio de la Llave | 1 869 | 37 | 109 | 2 015 | 94 |
| 31 Yucatán | 1 732 | 92 | 312 | 2 136 | 85 |
| 32 Zacatecas | 1 733 | 62 | 199 | 1 994 | 90 |
| Nacional | 55 907 | 2 262 | 7 378 | 65 547 | 88 |

Tasas de respuesta de individuo por estado

| Entidad | Completas | No viviendas | No conseguidas | Total | Tasa Respuesta |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------|----------------|
| 01 Aguascalientes | 1 857 | -- | 209 | 2 066 | 90 |
| 02 Baja California | 1 833 | 1 | 202 | 2 036 | 90 |
| 03 Baja California Sur | 1 872 | -- | 149 | 2 021 | 93 |
| 04 Campeche | 1 722 | -- | 342 | 2 064 | 83 |
| 05 Coahuila de Zaragoza | 1 702 | 1 | 245 | 1 948 | 87 |
| 06 Colima | 1 580 | 3 | 361 | 1 944 | 81 |
| 07 Chiapas | 1 852 | 3 | 194 | 2 049 | 91 |
| 08 Chihuahua | 1 714 | 2 | 264 | 1 980 | 87 |
| 09 Ciudad de México | 1 724 | 1 | 186 | 1 911 | 90 |
| 10 Durango | 1 886 | -- | 204 | 2 090 | 90 |
| 11 Guanajuato | 1 921 | 2 | 206 | 2 129 | 90 |
| 12 Guerrero | 1 957 | 5 | 184 | 2 146 | 91 |
| 13 Hidalgo | 1 732 | 2 | 384 | 2 118 | 82 |
| 14 Jalisco | 1 593 | 2 | 413 | 2 008 | 79 |
| 15 México | 1 716 | 2 | 308 | 2 026 | 85 |
| 16 Michoacán de Ocampo | 1 893 | 2 | 134 | 2 029 | 93 |
| 17 Morelos | 1 887 | -- | 108 | 1 995 | 95 |
| 18 Nayarit | 1 747 | 2 | 297 | 2 046 | 85 |
| 19 Nuevo León | 1 595 | 1 | 355 | 1 951 | 82 |
| 20 Oaxaca | 1 630 | -- | 224 | 1 854 | 88 |
| 21 Puebla | 1 630 | 1 | 328 | 1 959 | 83 |
| 22 Querétaro | 1 776 | 3 | 293 | 2 072 | 86 |
| 23 Quintana Roo | 1 652 | 2 | 468 | 2 122 | 78 |
| 24 San Luis Potosí | 1 880 | 1 | 259 | 2 140 | 88 |
| 25 Sinaloa | 1 854 | 3 | 154 | 2 011 | 92 |
| 26 Sonora | 1 829 | -- | 213 | 2 042 | 90 |
| 27 Tabasco | 1 960 | -- | 186 | 2 146 | 91 |
| 28 Tamaulipas | 1 656 | 1 | 322 | 1 979 | 84 |
| 29 Tlaxcala | 1 791 | 1 | 359 | 2 151 | 83 |
| 30 Veracruz de Ignacio de la Llave | 1 867 | 1 | 217 | 2 085 | 90 |
| 31 Yucatán | 1 699 | -- | 414 | 2 113 | 80 |
| 32 Zacatecas | 1 870 | -- | 184 | 2 054 | 91 |
| Nacional | 56 877 | 42 | 8 366 | 65 285 | 87 |



ANEXO B: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 2011, TRADICIONAL 2016 Y ENCODAT 2016-2017



ANEXO B: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 2011, TRADICIONAL 2016 Y ENCODAT 2016-2017

En general el análisis extenso de los datos ha demostrado que los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional presentan las mismas conclusiones prácticas; como ejemplo, en las figuras siguientes se comparan las estimaciones de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida.

Figura 1. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Tabaco.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza




Figura 2. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Alcohol.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza






Figura 3. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Drogas ilegales.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza



La Figura 1 es compatible con la hipótesis de que no hay diferencias significativas (estadística $T=1.4$) entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional para la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida. La Figura 2 es compatible con la diferencia entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional (estadística $T=2.16$); pero al comparar las estimaciones (ENCODAT 2016 y Tradicional) con las estimaciones de la ENA 2011 no se sugieren conclusiones con consecuencias prácticas diferentes. La Figura 3 es compatible con la hipótesis de que no hay diferencias significativas (estadística $T=1.2$) entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional para la prevalencia de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida. La afirmación general es que las estimaciones de los cuestionarios apoyan conclusiones con consecuencias prácticas iguales respecto a las políticas de salud pública.



ANEXO 1: TENDENCIAS DE ALCOHOL



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE ALCOHOL

Listado de Tablas

Necesidades de atención por el Consumo de Alcohol en la población de 12 a 65 años

Necesidades de atención por el Consumo de Alcohol en la población de 12 a 17 años

Necesidades de atención por el Consumo de Alcohol en la población de 18 a 65 años

Edad de inicio del consumo de alcohol

Población de usuarios de 12 a 65 años según sexo y patrón de consumo

Población de usuarios de 12 a 17 años según sexo y patrón de consumo

Población de usuarios de 18 a 65 años según sexo y patrón de consumo

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL**

**Necesidades de atención por el Consumo de Alcohol
en la población de 12 a 65 años**

Cuadro TA1

| | Encuesta Nacional 2016 | | | | | |
|---|------------------------|------|------------|------|------------|------|
| | Hombres | | Mujeres | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Con Dependencia | 1 616 987 | 3.9 | 267 615 | 0.6 | 1 884 601 | 2.2 |
| Abuso de alcohol | 2 600 933 | 6.3 | 781 587 | 1.8 | 3 382 520 | 4.0 |
| Consumo excesivo | 14 587 820 | 35.4 | 8 913 376 | 20.2 | 23 501 196 | 27.6 |
| Abstemios y consumidores que limitan su consumo a menos de 5 o 4 copas por ocasión | 22 362 877 | 54.3 | 34 130 864 | 77.4 | 56 493 741 | 66.3 |

Porcentajes obtenidos de cada tipo de necesidad según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL**

**Necesidades de atención por el Consumo de Alcohol
en la población de 12 a 17 años**

Cuadro TA2

| | Encuesta Nacional 2016 | | | | | |
|---|------------------------|------|-----------|------|------------|------|
| | Hombres | | Mujeres | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Con Dependencia | 65 367 | 0.9 | 50 170 | 0.7 | 115 537 | 0.8 |
| Abuso de alcohol | 123 577 | 1.7 | 103 054 | 1.5 | 226 631 | 1.6 |
| Consumo excesivo | 943 885 | 13.0 | 906 053 | 12.8 | 1 849 937 | 12.9 |
| Abstemios y consumidores que limitan su consumo a menos de 5 o 4 copas por ocasión | 6 115 085 | 84.4 | 6 027 889 | 85.1 | 12 142 974 | 84.7 |

Porcentajes obtenidos de cada tipo de necesidad según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL**

**Necesidades de atención por el Consumo de Alcohol
en la población de 18 a 65 años**

Cuadro TA3

| | Encuesta Nacional 2016 | | | | | |
|---|------------------------|------|------------|------|------------|------|
| | Hombres | | Mujeres | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Con Dependencia | 1 551 620 | 4.6 | 217 444 | 0.6 | 1 769 064 | 2.5 |
| Abuso de alcohol | 2 477 356 | 7.3 | 678 533 | 1.8 | 3 155 889 | 4.4 |
| Consumo excesivo | 13 643 935 | 40.2 | 8 007 323 | 21.6 | 21 651 259 | 30.5 |
| Abstemios y consumidores que limitan su consumo a menos de 5 o 4 copas por ocasión | 16 247 792 | 47.9 | 28 102 975 | 75.9 | 44 350 767 | 62.5 |

Porcentajes obtenidos de cada tipo de necesidad según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL**

Edad de inicio del consumo de alcohol

Cuadro TA4

| | Encuestas Nacionales | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2011 | | | 2016 | | |
| | 17 años o menos | 18 a 25 años | 26 a 65 años | 17 años o menos | 18 a 25 años | 26 a 65 años |
| Sexo | % | % | % | % | % | % |
| Hombres | 64.9 | 33.0 | 2.1 | 61.5 | 36.5 | 2.0 |
| Mujeres | 43.3 | 46.1 | 10.6 | 43.1 | 47.1 | 9.8 |
| Total | 55.2 | 38.9 | 5.9 | 53.1 | 41.3 | 5.6 |

Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL**

Población de usuarios de 12 a 65 años según sexo y patrón de consumo

Cuadro TA5

| | Encuestas Nacionales | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|------------|------|
| | 2011 | | | | | | 2016 | | | | | |
| | Hombres | | Mujeres | | Total | | Hombres | | Mujeres | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 15 892 337 | 41.3 | 6 367 821 | 15.5 | 22 260 158 | 28.0 | 18 730 429 | 45.5 | 9 943 943 | 22.6 | 28 674 372 | 33.6 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 8 065 347 | 20.9 | 1 690 963 | 4.1 | 9 756 310 | 12.3 | 12 304 954 | 29.9 | 4 536 139 | 10.3 | 16 841 092 | 19.8 |
| Consumo Diario | 548 144 | 1.4 | 70 709 | 0.2 | 618 853 | 0.8 | 1 861 978 | 4.5 | 626 981 | 1.4 | 2 488 959 | 2.9 |
| Bebedores Consuetudinarios | 3 703 074 | 9.6 | 581 207 | 1.4 | 4 284 281 | 5.4 | 5 663 996 | 13.8 | 1 558 322 | 3.5 | 7 222 319 | 8.5 |

Porcentajes obtenidos para cada tipo de consumo según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL**

Población de usuarios de 12 a 17 años según sexo y patrón de consumo

Cuadro TA6

| | Encuestas Nacionales | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|---------|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | 2011 | | | | | | 2016 | | | | | |
| | Hombres | | Mujeres | | Total | | Hombres | | Mujeres | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 1 053 085 | 15.5 | 571 753 | 8.6 | 1 624 838 | 12.1 | 1 123 549 | 15.5 | 1 054 943 | 14.9 | 2 178 492 | 15.2 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 427 538 | 6.3 | 144 286 | 2.2 | 571 824 | 4.3 | 643 018 | 8.9 | 544 100 | 7.7 | 1 187 118 | 8.3 |
| Consumo Diario | 24 031 | 0.4 | 2 771 | *** | 26 802 | 0.2 | 182 872 | 2.5 | 189 010 | 2.7 | 371 882 | 2.6 |
| Bebedores Consuetudinarios | 113 221 | 1.7 | 23 978 | 0.4 | 137 199 | 1.0 | 318 430 | 4.4 | 276 037 | 3.9 | 594 467 | 4.1 |

Porcentajes obtenidos para cada tipo de consumo según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL**

Población de usuarios de 18 a 65 años según sexo y patrón de consumo

Cuadro TA7

| | Encuestas Nacionales | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|------------|------|
| | 2011 | | | | | | 2016 | | | | | |
| | Hombres | | Mujeres | | Total | | Hombres | | Mujeres | | Total | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 14 839 253 | 46.8 | 5 796 068 | 16.8 | 20 635 321 | 31.2 | 17 606 880 | 51.9 | 8 888 999 | 24.0 | 26 495 879 | 37.4 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 7 637 809 | 24.1 | 1 546 677 | 4.5 | 9 184 486 | 13.9 | 11 661 936 | 34.4 | 3 992 038 | 10.8 | 15 653 974 | 22.1 |
| Consumo Diario | 524 113 | 1.7 | 67 938 | 0.2 | 592 052 | 0.9 | 1 679 106 | 5.0 | 437 971 | 1.2 | 2 117 077 | 3.0 |
| Bebedores Consuetudinarios | 3 589 853 | 11.3 | 557 229 | 1.6 | 4 147 082 | 6.3 | 5 345 567 | 15.8 | 1 282 285 | 3.5 | 6 627 852 | 9.3 |

Porcentajes obtenidos para cada tipo de consumo según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 2: TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES

Listado de Tablas

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población de 12 a 65 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población de 12 a 17 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población de 18 a 65 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población masculina de 12 a 17 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población masculina de 18 a 65 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población femenina de 12 a 17 años

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población femenina de 18 a 65 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 12 a 65 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 12 a 65 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 12 a 65 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 12 a 17 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 18 a 65 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 12 a 17 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 18 a 65 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 12 a 17 años

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 18 a 65 años

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRA1

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 32.4 | 18.8 | 35.8 | 25.0 |
| Noroccidental | 35.0 | 20.0 | 33.8 | 22.5 |
| Nororiental | 29.3 | 19.5 | 33.7 | 24.7 |
| Occidental | 24.3 | 10.5 | 42.0 | 26.3 |
| Centro | 28.9 | 9.0 | 32.6 | 17.5 |
| Ciudad de México | 26.0 | 9.8 | 37.0 | 18.5 |
| Centro Sur | 26.8 | 10.8 | 30.8 | 15.7 |
| Sur | 21.9 | 10.7 | 28.3 | 16.8 |
| Nacional | 28.0 | 12.3 | 33.6 | 19.8 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRA2

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 48.6 | 30.9 | 48.2 | 37.1 |
| Noroccidental | 49.3 | 31.4 | 44.7 | 32.6 |
| Nororiental | 44.3 | 33.5 | 47.4 | 37.4 |
| Occidental | 34.4 | 16.9 | 54.5 | 38.4 |
| Centro | 44.7 | 16.4 | 44.2 | 26.6 |
| Ciudad de México | 33.7 | 14.3 | 46.2 | 26.1 |
| Centro Sur | 40.0 | 19.8 | 43.1 | 25.5 |
| Sur | 31.3 | 18.1 | 39.9 | 26.1 |
| Nacional | 41.3 | 20.9 | 45.5 | 29.9 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRA3

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 16.9 | 7.2 | 23.7 | 13.4 |
| Noroccidental | 20.6 | 8.5 | 22.9 | 12.5 |
| Nororiental | 14.7 | 5.9 | 20.6 | 12.4 |
| Occidental | 14.8 | 4.5 | 30.1 | 14.9 |
| Centro | 14.5 | 2.2 | 22.0 | 9.1 |
| Ciudad de México | 19.0 | 5.7 | 28.5 | 11.6 |
| Centro Sur | 14.8 | 2.7 | 19.5 | 6.8 |
| Sur | 12.9 | 3.5 | 17.4 | 8.0 |
| Nacional | 15.5 | 4.1 | 22.6 | 10.3 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRA4

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 10.3 | 4.2 | 14.9 | 9.0 |
| Noroccidental | 10.9 | 3.6 | 12.4 | 5.9 |
| Nororiental | 9.8 | 5.6 | 12.6 | 7.1 |
| Occidental | 12.1 | 5.2 | 24.4 | 15.3 |
| Centro | 15.2 | 4.8 | 16.2 | 8.8 |
| Ciudad de México | 20.1 | 7.9 | 16.0 | 6.7 |
| Centro Sur | 9.5 | 2.2 | 14.2 | 7.1 |
| Sur | 6.8 | 2.3 | 8.8 | 4.9 |
| Nacional | 12.1 | 4.3 | 15.2 | 8.3 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población de 18 a 65 años

Cuadro TRA5

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 36.9 | 21.7 | 40.0 | 28.3 |
| Noroccidental | 39.6 | 23.2 | 37.9 | 25.7 |
| Nororiental | 32.9 | 22.1 | 37.7 | 28.0 |
| Occidental | 26.8 | 11.6 | 45.5 | 28.5 |
| Centro | 31.8 | 9.8 | 35.9 | 19.3 |
| Ciudad de México | 26.8 | 10.0 | 40.0 | 20.2 |
| Centro Sur | 30.8 | 12.8 | 34.5 | 17.6 |
| Sur | 25.3 | 12.5 | 32.6 | 19.4 |
| Nacional | 31.2 | 13.9 | 37.4 | 22.1 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población masculina de 12 a 17 años

Cuadro TRA6

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 14.2 | 6.1 | 15.1 | 9.9 |
| Noroccidental | 16.1 | 6.0 | 11.2 | 6.4 |
| Nororiental | 13.3 | 7.8 | 16.5 | 8.9 |
| Occidental | 13.9 | 8.5 | 24.2 | 15.3 |
| Centro | 21.2 | 7.7 | 15.8 | 8.9 |
| Ciudad de México | 22.2 | 9.6 | 13.5 | 5.2 |
| Centro Sur | 9.3 | 3.3 | 15.9 | 8.9 |
| Sur | 9.3 | 2.3 | 8.9 | 5.4 |
| Nacional | 15.5 | 6.3 | 15.5 | 8.9 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población masculina de 18 a 65 años

Cuadro TRA7

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 55.9 | 36.1 | 55.3 | 42.8 |
| Noroccidental | 55.8 | 36.4 | 51.3 | 37.7 |
| Nororiental | 50.3 | 38.5 | 53.4 | 43.0 |
| Occidental | 38.8 | 18.7 | 61.0 | 43.4 |
| Centro | 49.9 | 18.3 | 50.4 | 30.5 |
| Ciudad de México | 35.5 | 15.0 | 51.4 | 29.4 |
| Centro Sur | 47.6 | 23.9 | 49.8 | 29.5 |
| Sur | 36.4 | 21.8 | 47.0 | 30.8 |
| Nacional | 46.8 | 24.1 | 51.9 | 34.4 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población femenina de 12 a 17 años

Cuadro TRA8

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 6.2 | 2.3 | 14.8 | 8.1 |
| Noroccidental | 5.4 | 1.0 | 13.7 | 5.5 |
| Nororiental | 6.2 | 3.3 | 8.7 | 5.3 |
| Occidental | 10.2 | 1.8 | 24.5 | 15.4 |
| Centro | 9.0 | 1.9 | 16.6 | 8.6 |
| Ciudad de México | 18.1 | 6.2 | 18.9 | 8.4 |
| Centro Sur | 9.7 | 1.2 | 12.4 | 5.3 |
| Sur | 4.2 | 2.4 | 8.8 | 4.5 |
| Nacional | 8.6 | 2.2 | 14.9 | 7.7 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo excesivo de alcohol en el último año y en el último mes en la población femenina de 18 a 65 años

Cuadro TRA9

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes | Consumo Excesivo en el Último Año | Consumo Excesivo en el Último Mes |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 18.9 | 8.1 | 25.4 | 14.4 |
| Noroccidental | 23.4 | 10.0 | 24.6 | 13.8 |
| Nororiental | 16.3 | 6.4 | 22.7 | 13.7 |
| Occidental | 15.7 | 5.0 | 31.2 | 14.8 |
| Centro | 15.6 | 2.2 | 23.0 | 9.2 |
| Ciudad de México | 19.1 | 5.6 | 29.8 | 12.0 |
| Centro Sur | 15.9 | 3.0 | 21.0 | 7.1 |
| Sur | 14.8 | 3.7 | 19.2 | 8.8 |
| Nacional | 16.8 | 4.5 | 24.0 | 10.8 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRA10

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario % | Consuetudinarios % | Consumo Diario % | Consuetudinarios % |
| Norcentral | 0.8 | 8.7 | 3.9 | 13.0 |
| Noroccidental | 0.8 | 6.8 | 2.6 | 9.3 |
| Nororiental | 1.6 | 12.8 | 3.8 | 12.8 |
| Occidental | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 12.0 |
| Centro | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 6.6 |
| Ciudad de México | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 6.1 |
| Centro Sur | 0.8 | 6.1 | 3.3 | 6.9 |
| Sur | 0.6 | 5.7 | 2.6 | 7.1 |
| Nacional | 0.8 | 5.4 | 2.9 | 8.5 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRA11

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario % | Consuetudinarios % | Consumo Diario % | Consuetudinarios % |
| Norcentral | 1.3 | 15.2 | 5.9 | 20.3 |
| Noroccidental | 1.5 | 11.5 | 4.2 | 14.8 |
| Nororiental | 3.1 | 22.1 | 6.4 | 20.4 |
| Occidental | 1.4 | 5.9 | 4.8 | 18.9 |
| Centro | 1.1 | 5.2 | 3.5 | 11.2 |
| Ciudad de México | 0.9 | 4.7 | 3.4 | 9.1 |
| Centro Sur | 1.5 | 11.5 | 5.6 | 11.5 |
| Sur | 1.1 | 10.3 | 3.8 | 11.2 |
| Nacional | 1.4 | 9.6 | 4.5 | 13.8 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRA12

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario | Consuetudinarios | Consumo Diario | Consuetudinarios |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 5.9 |
| Noroccidental | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 3.7 |
| Nororiental | 0.1 | 3.6 | 1.4 | 5.5 |
| Occidental | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 5.5 |
| Centro | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.3 |
| Ciudad de México | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 3.4 |
| Centro Sur | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.7 |
| Sur | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 3.2 |
| Nacional | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 3.5 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRA13

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario % | Consuetudinarios % | Consumo Diario % | Consuetudinarios % |
| Norcentral | -- | 2.1 | 2.8 | 5.1 |
| Noroccidental | -- | 1.0 | 1.6 | 3.1 |
| Nororiental | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 3.7 |
| Occidental | -- | 1.2 | 4.6 | 7.6 |
| Centro | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 4.4 |
| Ciudad de México | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 3.9 |
| Centro Sur | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 3.2 |
| Sur | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
| Nacional | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 4.1 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 18 a 65 años

Cuadro TRA14

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario | Consuetudinarios | Consumo Diario | Consuetudinarios |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | 0.9 | 10.1 | 4.1 | 14.6 |
| Noroccidental | 0.9 | 7.9 | 2.8 | 10.4 |
| Nororiental | 1.7 | 14.7 | 4.1 | 14.5 |
| Occidental | 1.0 | 4.1 | 3.4 | 12.9 |
| Centro | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 7.0 |
| Ciudad de México | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 6.4 |
| Centro Sur | 0.9 | 7.4 | 3.4 | 7.7 |
| Sur | 0.6 | 6.7 | 2.8 | 8.2 |
| Nacional | 0.9 | 6.3 | 3.0 | 9.3 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 12 a 17 años

Cuadro TRA15

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario* | Consuetudinarios | Consumo Diario | Consuetudinarios |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | -- | 3.4 | 3.4 | 5.8 |
| Noroccidental | -- | 2.0 | 1.9 | 3.0 |
| Nororiental | 1.2 | 4.7 | 2.5 | 4.2 |
| Occidental | -- | 1.8 | 3.4 | 6.7 |
| Centro | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 5.0 |
| Ciudad de México | 0.7 | 3.1 | 2.3 | 2.9 |
| Centro Sur | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 3.6 |
| Sur | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.8 |
| Nacional | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 4.4 |

*El consumo diario en esta población es prácticamente cero. Se mantiene la información por consistencia entre los diversos cuadros presentados.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 18 a 65 años

Cuadro TRA16

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario % | Consuetudinarios % | Consumo Diario % | Consuetudinarios % |
| Norcentral | 1.6 | 17.7 | 6.5 | 23.4 |
| Noroccidental | 1.8 | 13.4 | 4.7 | 17.1 |
| Nororiental | 3.4 | 25.5 | 7.2 | 23.6 |
| Occidental | 1.7 | 6.8 | 5.1 | 21.5 |
| Centro | 1.3 | 6.2 | 3.8 | 12.6 |
| Ciudad de México | 0.9 | 5.0 | 3.6 | 10.1 |
| Centro Sur | 1.8 | 14.1 | 6.3 | 13.4 |
| Sur | 1.3 | 12.4 | 4.2 | 13.1 |
| Nacional | 1.7 | 11.3 | 5.0 | 15.8 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 12 a 17 años

Cuadro TRA17

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario* | Consuetudinarios | Consumo Diario | Consuetudinarios |
| | % | % | % | % |
| Norcentral | -- | 0.8 | 2.1 | 4.4 |
| Noroccidental | -- | -- | 1.3 | 3.3 |
| Nororiental | -- | -- | 2.1 | 3.2 |
| Occidental | -- | 0.6 | 6.0 | 8.5 |
| Centro | -- | -- | 2.8 | 3.8 |
| Ciudad de México | -- | 0.5 | 3.4 | 5.0 |
| Centro Sur | -- | 0.4 | 2.2 | 2.9 |
| Sur | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| Nacional | *** | 0.4 | 2.7 | 3.9 |

*El consumo diario en esta población es prácticamente cero. Se mantiene la información por consistencia entre los diversos cuadros presentados.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE ALCOHOL POR REGIONES**

Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 18 a 65 años

Cuadro TRA18

| Región | Encuestas Nacionales | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | Consumo Diario % | Consuetudinarios % | Consumo Diario % | Consuetudinarios % |
| Norcentral | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 6.2 |
| Noroccidental | 0.1 | 2.4 | 1.0 | 3.8 |
| Nororiental | 0.1 | 4.3 | 1.3 | 5.9 |
| Occidental | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 4.9 |
| Centro | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 2.1 |
| Ciudad de México | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 3.2 |
| Centro Sur | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 2.6 |
| Sur | -- | 1.4 | 1.5 | 3.5 |
| Nacional | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 3.5 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 3: INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

Listado de Tablas

Uso de los Intervalos de Confianza

- Consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo
- Consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo
- Consumo de alcohol en la población de 18 a 34 años según sexo
- Consumo de alcohol en la población de 35 a 65 años según sexo
- Consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población 12 a 65 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 12 a 65 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 12 a 65 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 12 a 17 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población de 18 a 65 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 12 a 17 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población masculina de 18 a 65 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 12 a 17 años
- Consumo diario y consuetudinario de alcohol en la población femenina de 18 a 65 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población de 12 a 65 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población de 12 a 17 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población de 18 a 65 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población masculina de 12 a 17 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población masculina de 18 a 65 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población femenina de 12 a 17 años
- Consumo excesivo en el último año y en el último mes en la población femenina de 18 a 65 años

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo excesivo de alcohol en el último mes entre los estados de Aguascalientes y Jalisco, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo excesivo de alcohol en el último mes de Aguascalientes en el cuadro de CONSUMO EXCESIVO EN EL ÚLTIMO AÑO Y EN EL ÚLTIMO MES EN LA POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS que en este caso sería 26.3% e IC 23.470-29.098; después se busca el dato de consumo excesivo de alcohol en el último mes de Jalisco en el cuadro de CONSUMO EXCESIVO EN EL ÚLTIMO AÑO Y EN EL ÚLTIMO MES EN LA POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS que es de 27.7% e IC 23.543-31.796. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo excesivo de alcohol en el último mes es igual en ambos estados. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es el que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo la población de 12 a 17 años de un Estado con la población de 12 a 17 años de otro, hombres y mujeres del mismo Estado y grupo de edad.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

Consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro ICA1

| | Total | | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 33.6 | 32.803-34.458 | 45.5 | 44.230-46.763 | 22.6 | 21.660-23.444 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 19.8 | 19.029-20.476 | 29.9 | 28.716-31.062 | 10.3 | 9.589-10.986 |
| Consumo Diario | 2.9 | 2.665-3.173 | 4.5 | 4.057-4.989 | 1.4 | 1.210-1.634 |
| Bebedores | 8.5 | 7.974-8.968 | 13.8 | 12.857-14.659 | 3.5 | 3.176-3.893 |
| Consuetudinarios | 2.2 | 1.901-2.519 | 3.9 | 3.321-4.534 | 0.6 | 0.439-0.775 |

Consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Cuadro ICA2

| | Total | | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 15.2 | 14.029-16.365 | 15.5 | 14.004-16.999 | 14.9 | 13.147-16.624 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 8.3 | 7.334-9.228 | 8.9 | 7.666-10.078 | 7.7 | 6.195-9.160 |
| Consumo Diario | 2.6 | 2.116-3.072 | 2.5 | 2.007-3.039 | 2.7 | 1.857-3.477 |
| Bebedores | 4.1 | 3.480-4.814 | 4.4 | 3.413-5.374 | 3.9 | 2.971-4.819 |
| Consuetudinarios | 0.8 | 0.448-1.163 | 0.9 | 0.604-1.199 | 0.7 | 0.048-1.368 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

Consumo de alcohol en la población de 18 a 34 años según sexo

Cuadro ICA3

| | Total | | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 44.6 | 43.209-46.074 | 58.4 | 56.287-60.523 | 31.8 | 30.060-33.498 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 27.7 | 26.453-29.032 | 40.6 | 38.496-42.669 | 15.7 | 14.342-17.143 |
| Consumo Diario Bebedores | 3.7 | 3.224-4.237 | 5.9 | 4.991-6.891 | 1.7 | 1.312-2.019 |
| Consuetudinarios | 11.6 | 10.760-12.501 | 18.4 | 16.862-20.010 | 5.3 | 4.539-6.001 |
| Dependencia | 3.1 | 2.616-3.525 | 5.4 | 4.547-6.311 | 0.9 | 0.568-1.165 |

Consumo de alcohol en la población de 35 a 65 años según sexo

Cuadro ICA4

| | Total | | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 30.6 | 29.578-31.700 | 45.8 | 43.975-47.617 | 17.0 | 16.007-17.979 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 16.8 | 15.908-17.774 | 28.5 | 26.897-30.201 | 6.3 | 5.661-6.938 |
| Consumo Diario Bebedores | 2.3 | 1.982-2.613 | 4.0 | 3.419-4.619 | 0.7 | 0.520-0.975 |
| Consuetudinarios | 7.2 | 6.493-7.981 | 13.2 | 11.802-14.682 | 1.8 | 1.495-2.166 |
| Dependencia | 2.0 | 1.402-2.524 | 3.8 | 2.614-4.928 | 0.3 | 0.197-0.473 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS

Consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

Cuadro ICA5

| | Total | | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Consumo Excesivo en el Último Año | 37.4 | 36.400-38.313 | 51.9 | 50.421-53.391 | 24.0 | 23.006-25.034 |
| Consumo Excesivo en el Último Mes | 22.1 | 21.221-22.921 | 34.4 | 32.967-35.793 | 10.8 | 10.020-11.555 |
| Consumo Diario Bebedores | 3.0 | 2.689-3.280 | 5.0 | 4.394-5.506 | 1.2 | 0.976-1.391 |
| Consuetudinarios | 9.3 | 8.759-9.931 | 15.8 | 14.686-16.832 | 3.5 | 3.070-3.860 |
| Dependencia | 2.5 | 2.131-2.857 | 4.6 | 3.847-5.302 | 0.6 | 0.428-0.747 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población 12 a 65 años**

Cuadro ICA6

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 3.7 | 2.574-4.876 | 11.3 | 9.234-13.366 |
| Baja California | 3.2 | 2.166-4.190 | 10.1 | 8.226-11.968 |
| Baja California Sur | 2.9 | 1.557-4.283 | 10.5 | 8.502-12.547 |
| Campeche | 2.2 | 1.169-3.248 | 7.7 | 6.024-9.318 |
| Chiapas | 1.8 | 0.609-3.000 | 3.2 | 1.895-4.517 |
| Chihuahua | 3.0 | 2.108-3.984 | 12.0 | 10.171-13.876 |
| Ciudad de México | 2.3 | 1.389-3.260 | 6.1 | 4.520-7.692 |
| Coahuila | 4.6 | 2.346-6.811 | 14.6 | 11.520-17.723 |
| Colima | 4.1 | 2.679-5.556 | 10.7 | 8.479-12.826 |
| Durango | 4.4 | 3.203-5.665 | 12.0 | 9.952-14.027 |
| Estado de México | 2.2 | 1.285-3.072 | 6.9 | 4.961-8.843 |
| Guanajuato | 2.7 | 1.801-3.694 | 8.0 | 6.363-9.582 |
| Guerrero | 2.5 | 1.469-3.482 | 7.4 | 5.444-9.316 |
| Hidalgo | 2.4 | 1.352-3.349 | 4.7 | 3.521-5.935 |
| Jalisco | 3.4 | 2.154-4.597 | 13.0 | 9.201-16.799 |
| Michoacán | 4.4 | 3.083-5.764 | 8.8 | 6.877-10.670 |
| Morelos | 3.4 | 1.934-4.869 | 6.0 | 4.226-7.849 |
| Nayarit | 3.5 | 1.961-5.036 | 9.8 | 7.856-11.687 |
| Nuevo León | 4.7 | 3.082-6.380 | 16.9 | 14.553-19.256 |
| Oaxaca | 2.6 | 1.471-3.682 | 5.1 | 3.679-6.439 |
| Puebla | 1.5 | 0.576-2.370 | 4.3 | 2.955-5.686 |
| Querétaro | 4.0 | 2.817-5.169 | 10.2 | 8.405-12.093 |
| Quintana Roo | 3.8 | 2.423-5.141 | 11.9 | 9.619-14.252 |
| San Luis Potosí | 3.9 | 2.660-5.186 | 7.6 | 5.858-9.317 |
| Sinaloa | 2.7 | 1.723-3.642 | 8.1 | 6.712-9.535 |
| Sonora | 1.9 | 1.123-2.711 | 9.1 | 7.246-10.995 |
| Tabasco | 3.5 | 1.547-5.511 | 7.9 | 5.708-10.191 |
| Tamaulipas | 2.4 | 1.586-3.272 | 10.5 | 8.586-12.414 |
| Tlaxcala | 1.9 | 1.007-2.777 | 5.8 | 4.210-7.321 |
| Veracruz | 3.2 | 1.992-4.491 | 6.5 | 4.753-8.163 |
| Yucatán | 2.6 | 1.409-3.890 | 10.6 | 8.305-12.983 |
| Zacatecas | 4.3 | 2.945-5.739 | 9.7 | 7.950-11.540 |
| Nacional | 2.9 | 2.665-3.173 | 8.5 | 7.974-8.968 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población masculina de 12 a 65 años**

Cuadro ICA7

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 4.8 | 2.689-6.888 | 18.6 | 14.662-22.596 |
| Baja California | 5.3 | 3.506-7.077 | 16.6 | 13.027-20.161 |
| Baja California Sur | 4.4 | 2.445-6.294 | 15.1 | 11.863-18.252 |
| Campeche | 2.8 | 1.200-4.338 | 12.9 | 9.675-16.089 |
| Chiapas | 2.7 | 0.695-4.658 | 5.3 | 2.944-7.750 |
| Chihuahua | 4.7 | 3.076-6.336 | 18.1 | 14.826-21.309 |
| Ciudad de México | 3.4 | 1.747-5.099 | 9.1 | 6.420-11.787 |
| Coahuila | 6.6 | 3.289-9.990 | 22.9 | 18.611-27.146 |
| Colima | 6.1 | 3.483-8.667 | 16.1 | 12.366-19.831 |
| Durango | 7.2 | 4.831-9.564 | 20.4 | 16.631-24.161 |
| Estado de México | 3.3 | 1.680-4.911 | 11.7 | 8.033-15.286 |
| Guanajuato | 4.4 | 2.555-6.179 | 13.8 | 10.870-16.803 |
| Guerrero | 4.2 | 2.336-6.063 | 13.1 | 9.168-17.030 |
| Hidalgo | 3.7 | 1.792-5.633 | 7.9 | 5.653-10.238 |
| Jalisco | 4.2 | 2.029-6.305 | 20.1 | 13.180-27.008 |
| Michoacán | 7.6 | 4.979-10.282 | 15.1 | 11.547-18.697 |
| Morelos | 4.6 | 2.258-6.879 | 9.3 | 6.096-12.518 |
| Nayarit | 5.9 | 2.938-8.815 | 15.0 | 11.527-18.420 |
| Nuevo León | 8.3 | 5.324-11.294 | 27.2 | 23.237-31.134 |
| Oaxaca | 3.6 | 1.628-5.598 | 7.2 | 4.805-9.681 |
| Puebla | 1.9 | 0.185-3.594 | 7.9 | 5.280-10.474 |
| Querétaro | 6.8 | 4.703-8.958 | 17.6 | 14.185-20.980 |
| Quintana Roo | 4.9 | 2.823-6.984 | 16.7 | 12.938-20.409 |
| San Luis Potosí | 6.5 | 4.040-9.010 | 13.1 | 9.905-16.289 |
| Sinaloa | 4.1 | 2.474-5.747 | 13.4 | 10.751-16.011 |
| Sonora | 3.0 | 1.563-4.387 | 13.9 | 10.727-17.055 |
| Tabasco | 5.7 | 1.781-9.526 | 13.2 | 9.096-17.300 |
| Tamaulipas | 3.4 | 2.048-4.720 | 15.5 | 12.462-18.577 |
| Tlaxcala | 3.1 | 1.477-4.772 | 9.8 | 6.867-12.638 |
| Veracruz | 5.9 | 3.411-8.487 | 10.8 | 7.697-13.896 |
| Yucatán | 3.7 | 1.539-5.766 | 16.6 | 12.240-20.938 |
| Zacatecas | 6.6 | 3.948-9.164 | 17.1 | 13.532-20.599 |
| Nacional | 4.5 | 4.057-4.989 | 13.8 | 12.857-14.659 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población femenina de 12 a 65 años**

Cuadro ICA8

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 2.7 | 1.522-3.974 | 4.6 | 3.128-6.006 |
| Baja California | 1.0 | 0.222-1.821 | 3.5 | 2.059-4.876 |
| Baja California Sur | 1.4 | 0.325-2.455 | 5.7 | 3.828-7.656 |
| Campeche | 1.7 | 0.736-2.611 | 2.7 | 1.424-3.980 |
| Chiapas | 1.0 | --- | 1.2 | --- |
| Chihuahua | 1.4 | 0.551-2.310 | 6.1 | 4.202-8.080 |
| Ciudad de México | 1.3 | 0.482-2.157 | 3.4 | 1.843-4.884 |
| Coahuila | 2.6 | 1.052-4.076 | 6.6 | 3.705-9.398 |
| Colima | 2.2 | 0.977-3.394 | 5.3 | 3.420-7.139 |
| Durango | 1.9 | 1.008-2.693 | 4.1 | 2.556-5.705 |
| Estado de México | 1.1 | 0.274-2.014 | 2.5 | 1.150-3.839 |
| Guanajuato | 1.3 | 0.598-1.991 | 2.7 | 1.435-3.990 |
| Guerrero | 0.9 | 0.279-1.515 | 2.1 | 1.128-3.166 |
| Hidalgo | 1.1 | 0.391-1.852 | 1.8 | 0.880-2.769 |
| Jalisco | 2.6 | 1.416-3.838 | 6.3 | 4.027-8.554 |
| Michoacán | 1.5 | 0.766-2.232 | 3.0 | 1.818-4.149 |
| Morelos | 2.3 | 0.443-4.243 | 3.1 | 1.150-4.997 |
| Nayarit | 1.2 | 0.492-1.876 | 4.7 | 3.003-6.414 |
| Nuevo León | 1.2 | 0.249-2.222 | 6.9 | 4.576-9.147 |
| Oaxaca | 1.7 | 0.307-3.010 | 3.1 | 1.486-4.770 |
| Puebla | 1.1 | 0.275-1.938 | 1.2 | 0.397-1.980 |
| Querétaro | 1.4 | 0.556-2.256 | 3.6 | 2.201-4.925 |
| Quintana Roo | 2.6 | 1.151-4.096 | 7.0 | 4.393-9.684 |
| San Luis Potosí | 1.5 | 0.641-2.407 | 2.5 | 1.346-3.667 |
| Sinaloa | 1.3 | 0.201-2.368 | 3.0 | 1.536-4.409 |
| Sonora | 0.9 | 0.201-1.524 | 4.4 | 2.893-5.843 |
| Tabasco | 1.5 | 0.499-2.589 | 3.0 | 1.453-4.642 |
| Tamaulipas | 1.5 | 0.548-2.467 | 5.7 | 3.254-8.055 |
| Tlaxcala | 0.8 | 0.232-1.313 | 2.1 | 1.160-3.125 |
| Veracruz | 0.7 | 0.222-1.264 | 2.5 | 1.459-3.453 |
| Yucatán | 1.7 | 0.324-3.077 | 5.0 | 2.891-7.148 |
| Zacatecas | 2.3 | 1.314-3.343 | 3.1 | 1.931-4.245 |
| Nacional | 1.4 | 1.210-1.634 | 3.5 | 3.176-3.893 |

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población de 12 a 17 años**

Cuadro ICA9

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 3.8 | 2.010-5.605 | 8.4 | 5.219-11.637 |
| Baja California | 2.0 | 0.586-3.504 | 2.7 | 0.979-4.323 |
| Baja California Sur | 1.9 | 0.440-3.448 | 4.2 | 1.539-6.877 |
| Campeche | 2.4 | 0.822-4.048 | 4.2 | 2.122-6.301 |
| Chiapas | 0.5 | --- | 0.5 | --- |
| Chihuahua | 2.7 | 1.033-4.321 | 6.1 | 3.674-8.488 |
| Ciudad de México | 2.8 | 0.986-4.631 | 3.9 | 1.373-6.404 |
| Coahuila | 1.6 | 0.497-2.661 | 3.5 | 1.377-5.554 |
| Colima | 4.4 | 2.002-6.872 | 5.0 | 2.441-7.590 |
| Durango | 4.9 | 2.586-7.195 | 5.8 | 3.215-8.317 |
| Estado de México | 2.5 | --- | 5.2 | 1.466-9.013 |
| Guanajuato | 2.7 | 0.919-4.391 | 5.6 | 2.649-8.583 |
| Guerrero | 1.1 | 0.156-2.028 | 1.7 | 0.384-3.091 |
| Hidalgo | 4.0 | 1.436-6.520 | 4.3 | 1.771-6.890 |
| Jalisco | 5.2 | 2.417-7.886 | 8.5 | 4.880-12.024 |
| Michoacán | 2.3 | 0.200-4.463 | 4.4 | 2.039-6.662 |
| Morelos | 3.5 | 1.171-5.867 | 3.4 | 1.309-5.531 |
| Nayarit | 3.1 | 1.063-5.171 | 3.6 | 1.544-5.561 |
| Nuevo León | 1.9 | 0.432-3.345 | 4.4 | 1.701-7.104 |
| Oaxaca | 2.7 | 0.542-4.891 | 2.3 | 0.635-3.899 |
| Puebla | 1.1 | --- | 1.1 | --- |
| Querétaro | 4.5 | 2.387-6.683 | 6.1 | 3.518-8.635 |
| Quintana Roo | 3.7 | 1.305-6.139 | 4.4 | 2.132-6.610 |
| San Luis Potosí | 3.3 | 1.469-5.162 | 4.2 | 2.037-6.432 |
| Sinaloa | 0.8 | --- | 2.1 | 0.551-3.603 |
| Sonora | 1.9 | 0.226-3.666 | 4.6 | 1.802-7.298 |
| Tabasco | 3.0 | 1.435-4.579 | 3.4 | 1.821-5.049 |
| Tamaulipas | 1.9 | 0.436-3.311 | 2.3 | 0.788-3.910 |
| Tlaxcala | 2.1 | 0.951-3.337 | 4.0 | 1.805-6.244 |
| Veracruz | 3.2 | 1.332-5.026 | 3.8 | 1.788-5.810 |
| Yucatán | 1.0 | --- | 2.7 | 0.842-4.564 |
| Zacatecas | 4.1 | 1.961-6.143 | 6.8 | 4.186-9.370 |
| Nacional | 2.6 | 2.116-3.072 | 4.1 | 3.480-4.814 |

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población de 18 a 65 años**

Cuadro ICA10

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 3.7 | 2.359-5.055 | 11.9 | 9.471-14.376 |
| Baja California | 3.4 | 2.228-4.552 | 11.5 | 9.311-13.669 |
| Baja California Sur | 3.1 | 1.627-4.556 | 11.6 | 9.364-13.904 |
| Campeche | 2.2 | 0.908-3.416 | 8.4 | 6.446-10.319 |
| Chiapas | 2.1 | 0.656-3.632 | 3.9 | 2.308-5.503 |
| Chihuahua | 3.1 | 2.066-4.172 | 13.2 | 11.032-15.365 |
| Ciudad de México | 2.3 | 1.198-3.311 | 6.4 | 4.638-8.218 |
| Coahuila | 5.2 | 2.541-7.817 | 16.9 | 13.207-20.504 |
| Colima | 4.1 | 2.405-5.709 | 11.7 | 9.293-14.138 |
| Durango | 4.3 | 2.956-5.711 | 13.4 | 10.870-15.856 |
| Estado de México | 2.1 | 1.128-3.107 | 7.2 | 4.915-9.520 |
| Guanajuato | 2.8 | 1.632-3.904 | 8.5 | 6.688-10.313 |
| Guerrero | 2.8 | 1.577-4.100 | 8.9 | 6.460-11.264 |
| Hidalgo | 2.0 | 0.873-3.136 | 4.8 | 3.348-6.277 |
| Jalisco | 3.0 | 1.596-4.446 | 13.9 | 9.460-18.355 |
| Michoacán | 4.9 | 3.295-6.492 | 9.8 | 7.463-12.072 |
| Morelos | 3.4 | 1.653-5.103 | 6.6 | 4.389-8.731 |
| Nayarit | 3.6 | 1.772-5.379 | 11.0 | 8.717-13.342 |
| Nuevo León | 5.2 | 3.275-7.161 | 19.0 | 16.362-21.731 |
| Oaxaca | 2.5 | 1.246-3.838 | 5.7 | 4.107-7.384 |
| Puebla | 1.6 | 0.511-2.596 | 5.0 | 3.358-6.737 |
| Querétaro | 3.9 | 2.547-5.215 | 11.1 | 8.928-13.303 |
| Quintana Roo | 3.8 | 2.214-5.372 | 13.3 | 10.595-16.024 |
| San Luis Potosí | 4.1 | 2.641-5.483 | 8.4 | 6.416-10.290 |
| Sinaloa | 3.1 | 1.913-4.211 | 9.3 | 7.691-10.997 |
| Sonora | 1.9 | 1.009-2.814 | 10.0 | 7.904-12.098 |
| Tabasco | 3.6 | 1.260-6.014 | 8.9 | 6.207-11.562 |
| Tamaulipas | 2.5 | 1.584-3.479 | 12.0 | 9.818-14.187 |
| Tlaxcala | 1.8 | 0.863-2.815 | 6.1 | 4.341-7.925 |
| Veracruz | 3.3 | 1.781-4.727 | 7.0 | 5.066-8.946 |
| Yucatán | 3.0 | 1.511-4.430 | 12.2 | 9.445-14.913 |
| Zacatecas | 4.4 | 2.695-6.118 | 10.4 | 8.213-12.598 |
| Nacional | 3.0 | 2.689-3.280 | 9.3 | 8.759-9.931 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población masculina de 12 a 17 años**

Cuadro ICA11

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 3.1 | 0.898-5.331 | 10.4 | 4.954-15.814 |
| Baja California | 2.7 | 0.449-5.013 | 3.6 | 0.919-6.380 |
| Baja California Sur | 1.4 | --- | 4.2 | 0.389-8.066 |
| Campeche | 1.1 | --- | 4.3 | 0.921-7.658 |
| Chiapas | 0.6 | --- | 0.6 | --- |
| Chihuahua | 2.6 | 0.484-4.635 | 6.5 | 2.990-10.090 |
| Ciudad de México | 2.3 | --- | 2.9 | --- |
| Coahuila | 2.4 | 0.466-4.294 | 3.4 | 0.984-5.767 |
| Colima | 4.6 | 1.470-7.638 | 5.8 | 2.092-9.540 |
| Durango | 6.6 | 2.898-10.367 | 8.1 | 3.824-12.471 |
| Estado de México | 1.2 | --- | 5.6 | --- |
| Guanajuato | 3.5 | 0.673-6.268 | 7.1 | 2.784-11.448 |
| Guerrero | 1.3 | --- | 1.2 | --- |
| Hidalgo | 5.8 | 1.273-10.321 | 6.2 | 1.610-10.709 |
| Jalisco | 3.3 | 0.058-6.499 | 6.7 | 2.399-11.035 |
| Michoacán | 2.4 | --- | 6.1 | 1.795-10.328 |
| Morelos | 3.7 | 0.321-7.061 | 2.6 | 0.307-4.849 |
| Nayarit | 4.7 | 0.909-8.568 | 3.9 | 0.838-6.871 |
| Nuevo León | 2.5 | 0.053-4.860 | 6.3 | 1.276-11.403 |
| Oaxaca | 3.8 | --- | 2.3 | --- |
| Puebla | 0.8 | --- | 0.8 | --- |
| Querétaro | 6.3 | 3.146-9.430 | 8.4 | 4.369-12.496 |
| Quintana Roo | 3.5 | 0.272-6.793 | 6.0 | 2.106-9.895 |
| San Luis Potosí | 3.8 | 1.063-6.485 | 3.9 | 1.374-6.515 |
| Sinaloa | 1.6 | --- | 2.7 | 0.335-5.014 |
| Sonora | 1.4 | --- | 2.2 | 0.360-3.984 |
| Tabasco | 4.4 | 1.667-7.104 | 4.0 | 1.748-6.285 |
| Tamaulipas | 1.4 | --- | 1.4 | --- |
| Tlaxcala | 2.7 | 0.930-4.453 | 4.8 | 1.695-7.833 |
| Veracruz | 3.1 | 0.622-5.568 | 3.9 | 1.096-6.684 |
| Yucatán | 1.1 | --- | 4.5 | 0.895-8.179 |
| Zacatecas | 2.5 | 0.544-4.365 | 6.3 | 3.471-9.128 |
| Nacional | 2.5 | 2.007-3.039 | 4.4 | 3.413-5.374 |

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población masculina de 18 a 65 años**

Cuadro ICA12

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 5.2 | 2.633-7.706 | 20.5 | 15.739-25.273 |
| Baja California | 5.8 | 3.641-7.915 | 19.1 | 14.828-23.281 |
| Baja California Sur | 4.9 | 2.602-7.156 | 16.9 | 13.229-20.655 |
| Campeche | 3.1 | 1.211-5.022 | 14.7 | 10.955-18.478 |
| Chiapas | 3.3 | 0.775-5.727 | 6.6 | 3.721-9.578 |
| Chihuahua | 5.1 | 3.256-7.028 | 20.4 | 16.543-24.280 |
| Ciudad de México | 3.6 | 1.671-5.540 | 10.1 | 7.011-13.189 |
| Coahuila | 7.5 | 3.546-11.523 | 27.0 | 21.886-32.065 |
| Colima | 6.4 | 3.325-9.425 | 18.1 | 13.805-22.438 |
| Durango | 7.3 | 4.594-10.064 | 23.2 | 18.591-27.895 |
| Estado de México | 3.7 | 1.788-5.642 | 12.9 | 8.584-17.179 |
| Guanajuato | 4.6 | 2.417-6.745 | 15.4 | 12.028-18.860 |
| Guerrero | 5.0 | 2.653-7.335 | 16.4 | 11.434-21.375 |
| Hidalgo | 3.2 | 1.059-5.410 | 8.4 | 5.524-11.183 |
| Jalisco | 4.4 | 1.800-6.914 | 23.0 | 14.850-31.057 |
| Michoacán | 8.9 | 5.618-12.138 | 17.3 | 12.929-21.667 |
| Morelos | 4.8 | 2.076-7.437 | 10.7 | 6.962-14.535 |
| Nayarit | 6.1 | 2.626-9.607 | 17.3 | 13.064-21.567 |
| Nuevo León | 9.3 | 5.854-12.829 | 30.9 | 26.357-35.369 |
| Oaxaca | 3.6 | 1.330-5.804 | 8.6 | 5.591-11.553 |
| Puebla | 2.2 | 0.084-4.227 | 9.6 | 6.341-12.844 |
| Querétaro | 6.9 | 4.472-9.426 | 19.6 | 15.562-23.613 |
| Quintana Roo | 5.2 | 2.762-7.548 | 18.6 | 14.230-23.040 |
| San Luis Potosí | 7.2 | 4.300-10.082 | 15.3 | 11.386-19.239 |
| Sinaloa | 4.6 | 2.644-6.618 | 15.6 | 12.495-18.695 |
| Sonora | 3.3 | 1.625-4.944 | 16.2 | 12.464-19.907 |
| Tabasco | 5.9 | 1.254-10.605 | 15.2 | 10.302-20.093 |
| Tamaulipas | 3.8 | 2.211-5.324 | 18.2 | 14.679-21.694 |
| Tlaxcala | 3.2 | 1.241-5.205 | 10.9 | 7.460-14.313 |
| Veracruz | 6.6 | 3.532-9.629 | 12.3 | 8.580-16.070 |
| Yucatán | 4.2 | 1.666-6.655 | 19.0 | 13.969-24.018 |
| Zacatecas | 7.6 | 4.267-10.857 | 19.7 | 15.321-24.090 |
| Nacional | 5.0 | 4.394-5.506 | 15.8 | 14.686-16.832 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población femenina de 12 a 17 años**

Cuadro ICA13

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 4.5 | 1.575-7.415 | 6.5 | 2.794-10.184 |
| Baja California | 1.3 | --- | 1.6 | --- |
| Baja California Sur | 2.5 | --- | 4.2 | 0.365-8.011 |
| Campeche | 3.7 | 0.882-6.610 | 4.1 | 1.303-6.961 |
| Chiapas | 0.4 | --- | 0.4 | --- |
| Chihuahua | 2.8 | 0.145-5.447 | 5.6 | 2.194-9.032 |
| Ciudad de México | 3.4 | 0.578-6.186 | 5.0 | 0.953-9.005 |
| Coahuila | 0.7 | --- | 3.6 | 0.057-7.065 |
| Colima | 4.3 | 0.503-8.123 | 4.2 | 0.563-7.772 |
| Durango | 3.1 | 0.677-5.563 | 3.3 | 1.224-5.468 |
| Estado de México | 3.8 | --- | 4.9 | 0.006-9.784 |
| Guanajuato | 1.8 | 0.304-3.386 | 4.1 | --- |
| Guerrero | 0.8 | --- | 2.3 | --- |
| Hidalgo | 2.1 | --- | 2.5 | 0.169-4.775 |
| Jalisco | 7.1 | 2.610-11.665 | 10.3 | 4.339-16.246 |
| Michoacán | 2.2 | 0.033-4.419 | 2.6 | 0.452-4.783 |
| Morelos | 3.3 | --- | 4.3 | 0.622-7.930 |
| Nayarit | 1.4 | 0.010-2.848 | 3.2 | 0.554-5.921 |
| Nuevo León | 1.3 | --- | 2.4 | 0.403-4.423 |
| Oaxaca | 1.6 | 0.025-3.258 | 2.3 | 0.456-4.107 |
| Puebla | 1.4 | --- | 1.4 | --- |
| Querétaro | 2.8 | 0.664-4.921 | 3.7 | 1.164-6.304 |
| Quintana Roo | 3.9 | 0.046-7.797 | 2.7 | 0.706-4.597 |
| San Luis Potosí | 2.9 | 0.283-5.418 | 4.5 | 0.895-8.159 |
| Sinaloa | -- | --- | 1.5 | --- |
| Sonora | 2.5 | --- | 7.0 | 2.024-11.942 |
| Tabasco | 1.6 | 0.002-3.215 | 2.8 | 0.391-5.299 |
| Tamaulipas | 2.4 | --- | 3.3 | 0.588-5.956 |
| Tlaxcala | 1.6 | --- | 3.3 | 0.897-5.641 |
| Veracruz | 3.3 | 0.386-6.147 | 3.7 | 0.659-6.749 |
| Yucatán | 0.9 | --- | 0.9 | --- |
| Zacatecas | 5.8 | 1.882-9.619 | 7.3 | 2.702-11.870 |
| Nacional | 2.7 | 1.857-3.477 | 3.9 | 2.971-4.819 |

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo diario y consuetudinario de alcohol
en la población femenina de 18 a 65 años**

Cuadro ICA14

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Consumo Diario | | Consuetudinarios | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 2.4 | 1.016-3.756 | 4.2 | 2.555-5.781 |
| Baja California | 1.0 | 0.187-1.745 | 3.8 | 2.233-5.388 |
| Baja California Sur | 1.2 | 0.264-2.135 | 6.0 | 4.040-7.996 |
| Campeche | 1.3 | 0.246-2.281 | 2.4 | 0.954-3.884 |
| Chiapas | 1.1 | --- | 1.4 | --- |
| Chihuahua | 1.2 | 0.289-2.048 | 6.2 | 4.123-8.363 |
| Ciudad de México | 1.0 | 0.161-1.936 | 3.2 | 1.504-4.798 |
| Coahuila | 2.9 | 1.127-4.700 | 7.1 | 3.835-10.410 |
| Colima | 1.8 | 0.554-3.049 | 5.5 | 3.446-7.514 |
| Durango | 1.6 | 0.773-2.395 | 4.3 | 2.462-6.128 |
| Estado de México | 0.7 | 0.059-1.268 | 2.1 | 0.666-3.463 |
| Guanajuato | 1.2 | 0.374-1.984 | 2.4 | 1.116-3.713 |
| Guerrero | 0.9 | 0.167-1.656 | 2.1 | 0.977-3.263 |
| Hidalgo | 0.9 | 0.128-1.716 | 1.7 | 0.660-2.733 |
| Jalisco | 1.8 | 0.566-3.007 | 5.5 | 3.132-7.957 |
| Michoacán | 1.3 | 0.566-2.124 | 3.1 | 1.694-4.428 |
| Morelos | 2.2 | --- | 2.8 | 0.617-5.081 |
| Nayarit | 1.1 | 0.376-1.897 | 5.0 | 3.072-6.916 |
| Nuevo León | 1.2 | 0.093-2.355 | 7.6 | 4.978-10.225 |
| Oaxaca | 1.7 | 0.042-3.284 | 3.3 | 1.382-5.259 |
| Puebla | 1.0 | 0.210-1.860 | 1.1 | 0.376-1.893 |
| Querétaro | 1.1 | 0.217-2.048 | 3.5 | 1.935-5.122 |
| Quintana Roo | 2.4 | 0.764-4.017 | 7.8 | 4.768-10.883 |
| San Luis Potosí | 1.2 | 0.352-2.123 | 2.1 | 0.889-3.250 |
| Sinaloa | 1.5 | 0.245-2.829 | 3.3 | 1.630-4.907 |
| Sonora | 0.6 | 0.032-1.069 | 3.9 | 2.351-5.393 |
| Tabasco | 1.5 | 0.330-2.733 | 3.1 | 1.237-4.937 |
| Tamaulipas | 1.3 | 0.304-2.393 | 6.1 | 3.320-8.845 |
| Tlaxcala | 0.6 | 0.068-1.156 | 1.9 | 0.901-2.939 |
| Veracruz | 0.3 | --- | 2.2 | 1.154-3.279 |
| Yucatán | 1.9 | 0.195-3.516 | 5.8 | 3.215-8.378 |
| Zacatecas | 1.6 | 0.613-2.657 | 2.2 | 1.075-3.400 |
| Nacional | 1.2 | 0.976-1.391 | 3.5 | 3.070-3.860 |

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población de 12 a 65 años**

Cuadro ICA15

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 39.0 | 35.972-41.939 | 26.3 | 23.470-29.098 |
| Baja California | 33.2 | 30.272-36.165 | 21.9 | 19.253-24.538 |
| Baja California Sur | 38.6 | 35.401-41.730 | 25.8 | 23.002-28.574 |
| Campeche | 32.3 | 29.201-35.478 | 19.5 | 16.886-22.144 |
| Chiapas | 20.3 | 17.235-23.346 | 9.9 | 7.411-12.379 |
| Chihuahua | 35.7 | 32.287-39.196 | 23.8 | 20.837-26.664 |
| Ciudad de México | 37.0 | 33.929-39.990 | 18.5 | 15.789-21.208 |
| Coahuila | 36.8 | 33.662-39.993 | 27.5 | 24.465-30.631 |
| Colima | 38.8 | 34.733-42.946 | 23.8 | 20.404-27.260 |
| Durango | 33.9 | 30.725-37.096 | 23.2 | 20.455-25.942 |
| Estado de México | 32.1 | 28.436-35.732 | 17.4 | 14.460-20.417 |
| Guanajuato | 31.7 | 28.939-34.495 | 19.2 | 16.907-21.447 |
| Guerrero | 31.6 | 28.521-34.702 | 15.6 | 12.634-18.499 |
| Hidalgo | 33.1 | 29.790-36.442 | 15.2 | 13.176-17.269 |
| Jalisco | 44.4 | 40.157-48.659 | 27.7 | 23.543-31.796 |
| Michoacán | 36.5 | 33.664-39.320 | 20.2 | 17.562-22.757 |
| Morelos | 30.1 | 26.677-33.435 | 16.2 | 13.432-18.930 |
| Nayarit | 41.6 | 38.274-45.005 | 23.7 | 21.436-25.992 |
| Nuevo León | 38.8 | 35.707-41.992 | 30.3 | 27.129-33.529 |
| Oaxaca | 28.0 | 24.149-31.946 | 13.5 | 11.195-15.785 |
| Puebla | 34.8 | 30.236-39.356 | 17.1 | 12.913-21.291 |
| Querétaro | 33.0 | 29.845-36.109 | 18.7 | 15.957-21.498 |
| Quintana Roo | 40.5 | 36.727-44.277 | 25.4 | 21.957-28.786 |
| San Luis Potosí | 29.6 | 26.270-32.927 | 17.9 | 15.138-20.621 |
| Sinaloa | 32.0 | 29.730-34.306 | 20.3 | 17.982-22.579 |
| Sonora | 35.2 | 32.522-37.904 | 24.8 | 22.013-27.549 |
| Tabasco | 28.7 | 25.556-31.885 | 16.9 | 13.981-19.751 |
| Tamaulipas | 29.0 | 26.217-31.802 | 21.2 | 18.316-24.034 |
| Tlaxcala | 34.5 | 31.322-37.631 | 16.8 | 14.235-19.358 |
| Veracruz | 28.5 | 25.942-31.109 | 14.3 | 11.862-16.649 |
| Yucatán | 34.6 | 30.560-38.564 | 24.2 | 20.304-28.012 |
| Zacatecas | 33.6 | 30.309-36.981 | 22.2 | 19.489-24.905 |
| Nacional | 33.6 | 32.803-34.458 | 19.8 | 19.029-20.476 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población masculina de 12 a 65 años**

Cuadro ICA16

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 51.3 | 46.902-55.777 | 39.4 | 34.754-44.059 |
| Baja California | 43.7 | 39.204-48.110 | 31.7 | 27.410-36.017 |
| Baja California Sur | 50.8 | 46.439-55.161 | 35.8 | 31.680-39.861 |
| Campeche | 43.9 | 38.928-48.787 | 29.8 | 25.379-34.213 |
| Chiapas | 30.6 | 25.880-35.371 | 17.1 | 12.516-21.627 |
| Chihuahua | 45.2 | 40.367-50.128 | 34.0 | 29.641-38.262 |
| Ciudad de México | 46.2 | 41.571-50.766 | 26.1 | 21.568-30.608 |
| Coahuila | 50.7 | 46.321-55.109 | 40.3 | 36.016-44.655 |
| Colima | 50.0 | 43.900-56.015 | 34.9 | 29.339-40.408 |
| Durango | 50.1 | 45.511-54.756 | 37.8 | 33.270-42.351 |
| Estado de México | 42.3 | 36.107-48.406 | 25.4 | 20.550-30.315 |
| Guanajuato | 45.5 | 40.959-50.086 | 30.9 | 26.954-34.752 |
| Guerrero | 43.2 | 38.472-47.877 | 25.8 | 20.403-31.247 |
| Hidalgo | 45.6 | 41.354-49.748 | 24.0 | 20.504-27.581 |
| Jalisco | 56.7 | 50.935-62.438 | 39.2 | 32.643-45.669 |
| Michoacán | 51.6 | 47.654-55.591 | 33.4 | 29.103-37.641 |
| Morelos | 41.2 | 36.330-46.099 | 24.1 | 19.341-28.785 |
| Nayarit | 51.8 | 47.223-56.390 | 35.9 | 31.979-39.756 |
| Nuevo León | 53.8 | 49.265-58.314 | 44.8 | 40.172-49.472 |
| Oaxaca | 37.9 | 31.989-43.758 | 21.3 | 17.113-25.424 |
| Puebla | 48.3 | 41.922-54.702 | 27.0 | 19.838-34.172 |
| Querétaro | 44.7 | 39.768-49.653 | 30.1 | 25.290-34.852 |
| Quintana Roo | 52.1 | 46.597-57.666 | 34.8 | 29.755-39.805 |
| San Luis Potosí | 43.0 | 37.681-48.230 | 28.4 | 24.050-32.805 |
| Sinaloa | 43.5 | 39.666-47.353 | 30.9 | 27.157-34.634 |
| Sonora | 45.6 | 41.171-50.012 | 34.5 | 29.911-39.030 |
| Tabasco | 42.3 | 37.565-47.125 | 27.3 | 22.615-32.083 |
| Tamaulipas | 40.9 | 37.074-44.654 | 32.8 | 28.313-37.208 |
| Tlaxcala | 46.7 | 41.712-51.667 | 26.1 | 21.809-30.382 |
| Veracruz | 40.8 | 36.633-45.032 | 22.9 | 18.697-27.012 |
| Yucatán | 45.8 | 40.040-51.573 | 35.5 | 29.918-41.001 |
| Zacatecas | 49.9 | 45.010-54.795 | 37.0 | 32.584-41.497 |
| Nacional | 45.5 | 44.230-46.763 | 29.9 | 28.716-31.062 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población femenina de 12 a 65 años**

Cuadro ICA17

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 27.6 | 23.986-31.169 | 14.2 | 11.887-16.571 |
| Baja California | 22.6 | 19.170-25.963 | 11.9 | 9.355-14.399 |
| Baja California Sur | 25.7 | 21.837-29.479 | 15.3 | 12.411-18.102 |
| Campeche | 21.4 | 18.313-24.400 | 9.7 | 7.150-12.273 |
| Chiapas | 10.8 | 7.807-13.752 | 3.3 | 1.648-4.934 |
| Chihuahua | 26.5 | 22.687-30.293 | 13.8 | 10.985-16.658 |
| Ciudad de México | 28.5 | 24.923-32.144 | 11.6 | 8.862-14.247 |
| Coahuila | 23.3 | 19.664-26.847 | 15.1 | 11.833-18.267 |
| Colima | 27.9 | 23.872-31.870 | 12.9 | 10.037-15.840 |
| Durango | 18.7 | 15.410-22.077 | 9.5 | 7.092-11.985 |
| Estado de México | 22.7 | 19.259-26.060 | 10.0 | 7.025-13.039 |
| Guanajuato | 19.3 | 16.290-22.373 | 8.7 | 6.359-11.045 |
| Guerrero | 21.0 | 18.189-23.872 | 6.2 | 4.527-7.831 |
| Hidalgo | 21.9 | 17.940-25.846 | 7.3 | 5.137-9.387 |
| Jalisco | 32.8 | 26.813-38.773 | 16.8 | 12.206-21.403 |
| Michoacán | 22.7 | 19.441-25.948 | 8.1 | 6.086-10.133 |
| Morelos | 19.9 | 15.808-24.067 | 9.0 | 5.552-12.517 |
| Nayarit | 31.7 | 27.738-35.752 | 11.9 | 9.527-14.244 |
| Nuevo León | 24.3 | 20.256-28.254 | 16.2 | 12.784-19.559 |
| Oaxaca | 19.4 | 15.300-23.407 | 6.6 | 4.698-8.517 |
| Puebla | 22.9 | 18.758-27.032 | 8.4 | 5.178-11.585 |
| Querétaro | 22.3 | 18.571-25.987 | 8.4 | 5.983-10.786 |
| Quintana Roo | 28.5 | 24.159-32.803 | 15.6 | 11.834-19.457 |
| San Luis Potosí | 17.3 | 13.174-21.387 | 8.2 | 4.791-11.513 |
| Sinaloa | 20.8 | 17.283-24.232 | 9.9 | 7.195-12.565 |
| Sonora | 24.9 | 21.254-28.494 | 15.1 | 12.216-18.040 |
| Tabasco | 16.0 | 12.874-19.114 | 7.1 | 4.796-9.354 |
| Tamaulipas | 17.6 | 14.123-21.011 | 10.0 | 7.214-12.769 |
| Tlaxcala | 23.4 | 20.171-26.587 | 8.3 | 6.043-10.651 |
| Veracruz | 17.2 | 14.984-19.362 | 6.3 | 4.633-8.015 |
| Yucatán | 23.9 | 19.360-28.488 | 13.5 | 9.542-17.391 |
| Zacatecas | 18.9 | 15.477-22.248 | 8.7 | 6.635-10.767 |
| Nacional | 22.6 | 21.660-23.444 | 10.3 | 9.589-10.986 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población de 12 a 17 años**

Cuadro ICA18

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 19.0 | 14.398-23.654 | 13.0 | 8.996-16.912 |
| Baja California | 11.5 | 6.010-16.896 | 5.4 | 2.844-8.040 |
| Baja California Sur | 12.7 | 8.406-16.995 | 7.2 | 3.592-10.804 |
| Campeche | 12.9 | 9.390-16.477 | 7.1 | 4.392-9.895 |
| Chiapas | 5.0 | 2.518-7.534 | 2.4 | 0.973-3.888 |
| Chihuahua | 15.3 | 10.927-19.746 | 10.2 | 6.586-13.730 |
| Ciudad de México | 16.0 | 10.819-21.268 | 6.7 | 3.680-9.814 |
| Coahuila | 12.9 | 8.975-16.889 | 7.2 | 4.300-10.002 |
| Colima | 15.6 | 10.003-21.103 | 8.8 | 5.263-12.284 |
| Durango | 17.4 | 13.367-21.366 | 9.9 | 6.857-12.904 |
| Estado de México | 16.5 | 11.250-21.763 | 9.9 | 4.768-15.090 |
| Guanajuato | 19.1 | 14.316-23.803 | 9.6 | 6.004-13.268 |
| Guerrero | 10.2 | 7.057-13.338 | 5.5 | 3.043-8.015 |
| Hidalgo | 16.3 | 11.346-21.349 | 8.8 | 5.479-12.083 |
| Jalisco | 28.6 | 21.261-35.970 | 17.9 | 12.462-23.424 |
| Michoacán | 22.0 | 16.968-27.019 | 10.8 | 6.994-14.668 |
| Morelos | 16.2 | 10.593-21.792 | 7.7 | 3.712-11.672 |
| Nayarit | 16.4 | 12.310-20.418 | 7.8 | 4.972-10.536 |
| Nuevo León | 14.3 | 10.742-17.882 | 8.5 | 5.410-11.575 |
| Oaxaca | 11.3 | 5.914-16.593 | 5.1 | 2.575-7.549 |
| Puebla | 12.1 | 7.957-16.213 | 5.1 | 2.420-7.766 |
| Querétaro | 16.2 | 11.789-20.607 | 9.2 | 6.180-12.298 |
| Quintana Roo | 12.7 | 8.399-16.932 | 6.2 | 3.739-8.689 |
| San Luis Potosí | 15.1 | 10.254-19.847 | 7.1 | 4.461-9.642 |
| Sinaloa | 13.2 | 8.559-17.927 | 5.0 | 2.637-7.275 |
| Sonora | 12.7 | 9.022-16.323 | 7.3 | 4.267-10.270 |
| Tabasco | 11.5 | 8.128-14.796 | 6.7 | 3.991-9.316 |
| Tamaulipas | 7.9 | 4.914-10.883 | 5.2 | 2.684-7.735 |
| Tlaxcala | 19.0 | 14.954-23.132 | 9.6 | 6.407-12.855 |
| Veracruz | 13.0 | 9.151-16.783 | 6.8 | 4.023-9.496 |
| Yucatán | 11.5 | 6.425-16.643 | 7.9 | 2.652-13.083 |
| Zacatecas | 18.3 | 13.928-22.588 | 13.2 | 9.290-17.169 |
| Nacional | 15.2 | 14.029-16.365 | 8.3 | 7.334-9.228 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población de 18 a 65 años**

Cuadro ICA19

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 43.3 | 39.745-46.818 | 29.2 | 25.938-32.417 |
| Baja California | 37.3 | 34.013-40.565 | 25.0 | 21.897-28.049 |
| Baja California Sur | 43.1 | 39.558-46.660 | 29.1 | 25.976-32.131 |
| Campeche | 36.3 | 32.732-39.927 | 22.1 | 18.962-25.155 |
| Chiapas | 24.2 | 20.586-27.827 | 11.8 | 8.811-14.809 |
| Chihuahua | 39.8 | 35.854-43.697 | 26.4 | 23.116-29.759 |
| Ciudad de México | 40.0 | 36.678-43.308 | 20.2 | 17.141-23.265 |
| Coahuila | 41.6 | 38.159-45.068 | 31.6 | 28.154-35.112 |
| Colima | 43.2 | 38.989-47.471 | 26.7 | 22.876-30.467 |
| Durango | 37.6 | 33.909-41.213 | 26.1 | 22.919-29.357 |
| Estado de México | 35.0 | 30.855-39.223 | 18.9 | 15.349-22.376 |
| Guanajuato | 34.6 | 31.397-37.711 | 21.3 | 18.669-23.961 |
| Guerrero | 37.2 | 33.457-41.012 | 18.2 | 14.596-21.809 |
| Hidalgo | 36.7 | 32.793-40.570 | 16.6 | 14.148-19.036 |
| Jalisco | 47.6 | 42.346-52.771 | 29.6 | 24.824-34.397 |
| Michoacán | 39.8 | 36.629-42.876 | 22.3 | 19.310-25.203 |
| Morelos | 32.8 | 28.929-36.719 | 17.9 | 14.889-20.864 |
| Nayarit | 46.8 | 42.768-50.738 | 26.9 | 24.224-29.661 |
| Nuevo León | 43.1 | 39.465-46.641 | 34.1 | 30.369-37.770 |
| Oaxaca | 32.2 | 28.065-36.279 | 15.6 | 12.823-18.296 |
| Puebla | 40.0 | 34.223-45.692 | 19.8 | 14.534-25.128 |
| Querétaro | 36.5 | 32.715-40.208 | 20.7 | 17.267-24.129 |
| Quintana Roo | 45.6 | 41.536-49.579 | 28.9 | 24.885-32.815 |
| San Luis Potosí | 32.9 | 29.080-36.761 | 20.4 | 17.062-23.642 |
| Sinaloa | 35.8 | 33.228-38.383 | 23.4 | 20.775-25.970 |
| Sonora | 39.6 | 36.529-42.586 | 28.2 | 24.958-31.356 |
| Tabasco | 32.3 | 28.831-35.757 | 19.0 | 15.723-22.239 |
| Tamaulipas | 32.9 | 29.677-36.125 | 24.1 | 20.875-27.361 |
| Tlaxcala | 37.7 | 34.153-41.327 | 18.3 | 15.445-21.179 |
| Veracruz | 31.7 | 28.829-34.631 | 15.8 | 13.071-18.528 |
| Yucatán | 39.0 | 34.407-43.620 | 27.3 | 23.064-31.551 |
| Zacatecas | 37.1 | 33.227-40.912 | 24.2 | 21.056-27.330 |
| Nacional | 37.4 | 36.400-38.313 | 22.1 | 21.221-22.921 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población masculina de 12 a 17 años**

Cuadro ICA20

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 18.7 | 12.111-25.257 | 14.3 | 8.388-20.183 |
| Baja California | 10.5 | 5.851-15.159 | 6.7 | 3.064-10.280 |
| Baja California Sur | 13.5 | 7.196-19.800 | 7.8 | 2.974-12.645 |
| Campeche | 12.6 | 7.167-18.080 | 8.5 | 3.706-13.239 |
| Chiapas | 5.1 | 2.436-7.819 | 2.7 | 0.861-4.636 |
| Chihuahua | 14.3 | 8.399-20.165 | 9.3 | 4.794-13.833 |
| Ciudad de México | 13.5 | 7.853-19.054 | 5.2 | 1.412-8.988 |
| Coahuila | 10.9 | 5.926-15.833 | 7.9 | 4.080-11.665 |
| Colima | 13.3 | 7.793-18.729 | 9.9 | 4.973-14.878 |
| Durango | 23.5 | 17.632-29.420 | 14.5 | 9.264-19.727 |
| Estado de México | 15.3 | 8.634-22.059 | 9.9 | 3.514-16.211 |
| Guanajuato | 17.8 | 11.766-23.866 | 11.4 | 6.491-16.223 |
| Guerrero | 9.9 | 5.513-14.240 | 6.9 | 2.847-10.925 |
| Hidalgo | 20.7 | 13.009-28.457 | 13.0 | 7.664-18.426 |
| Jalisco | 28.7 | 19.877-37.522 | 17.4 | 10.642-24.213 |
| Michoacán | 23.8 | 15.762-31.868 | 15.3 | 8.956-21.698 |
| Morelos | 17.9 | 10.458-25.373 | 4.7 | 1.556-7.774 |
| Nayarit | 16.3 | 10.824-21.864 | 7.3 | 3.324-11.338 |
| Nuevo León | 21.5 | 15.043-27.993 | 12.6 | 6.808-18.306 |
| Oaxaca | 15.7 | 5.814-25.606 | 6.4 | 1.883-10.851 |
| Puebla | 11.5 | 5.810-17.237 | 2.8 | 0.332-5.227 |
| Querétaro | 15.8 | 10.423-21.094 | 10.7 | 6.335-15.096 |
| Quintana Roo | 15.7 | 8.580-22.761 | 8.6 | 4.221-12.904 |
| San Luis Potosí | 17.7 | 9.722-25.741 | 6.6 | 3.414-9.807 |
| Sinaloa | 12.6 | 8.157-17.016 | 6.2 | 2.601-9.711 |
| Sonora | 10.0 | 6.220-13.761 | 5.9 | 3.037-8.795 |
| Tabasco | 10.3 | 5.929-14.588 | 5.7 | 2.559-8.892 |
| Tamaulipas | 8.0 | 3.405-12.582 | 5.8 | 1.678-9.904 |
| Tlaxcala | 19.4 | 13.355-25.530 | 10.5 | 5.798-15.235 |
| Veracruz | 14.2 | 9.105-19.333 | 7.5 | 3.518-11.389 |
| Yucatán | 10.8 | 6.099-15.492 | 8.4 | 3.776-12.939 |
| Zacatecas | 17.8 | 11.297-24.269 | 13.9 | 8.101-19.755 |
| Nacional | 15.5 | 14.004-16.999 | 8.9 | 7.666-10.078 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población masculina de 18 a 65 años**

Cuadro ICA21

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 58.8 | 53.635-63.912 | 45.1 | 39.820-50.430 |
| Baja California | 50.0 | 44.966-54.950 | 36.5 | 31.400-41.546 |
| Baja California Sur | 57.3 | 52.487-62.094 | 40.6 | 35.941-45.331 |
| Campeche | 50.5 | 44.829-56.225 | 34.3 | 29.101-39.597 |
| Chiapas | 37.6 | 32.102-43.041 | 21.0 | 15.463-26.484 |
| Chihuahua | 51.5 | 46.160-56.929 | 39.0 | 33.931-43.993 |
| Ciudad de México | 51.4 | 46.426-56.388 | 29.4 | 24.315-34.550 |
| Coahuila | 59.1 | 54.449-63.718 | 47.2 | 42.223-52.088 |
| Colima | 57.2 | 50.759-63.595 | 39.8 | 33.357-46.208 |
| Durango | 56.3 | 51.024-61.613 | 43.2 | 37.997-48.463 |
| Estado de México | 47.7 | 40.451-54.875 | 28.6 | 22.648-34.473 |
| Guanajuato | 52.2 | 46.951-57.351 | 35.5 | 30.885-40.148 |
| Guerrero | 52.4 | 46.646-58.237 | 31.1 | 24.245-37.947 |
| Hidalgo | 51.2 | 46.304-56.163 | 26.6 | 22.347-30.775 |
| Jalisco | 62.7 | 56.052-69.285 | 43.8 | 36.071-51.530 |
| Michoacán | 58.3 | 53.854-62.750 | 37.7 | 32.668-42.746 |
| Morelos | 46.2 | 40.317-52.095 | 28.2 | 22.827-33.612 |
| Nayarit | 59.3 | 53.703-64.849 | 41.9 | 37.374-46.383 |
| Nuevo León | 59.5 | 54.352-64.613 | 50.5 | 45.185-55.842 |
| Oaxaca | 43.8 | 37.089-50.466 | 25.2 | 20.171-30.305 |
| Puebla | 57.2 | 48.964-65.471 | 32.9 | 23.685-42.054 |
| Querétaro | 51.1 | 45.047-57.061 | 34.3 | 28.274-40.349 |
| Quintana Roo | 58.8 | 52.956-64.710 | 39.6 | 33.581-45.616 |
| San Luis Potosí | 49.1 | 42.554-55.569 | 33.7 | 28.222-39.196 |
| Sinaloa | 49.9 | 45.623-54.185 | 36.0 | 31.725-40.297 |
| Sonora | 52.6 | 47.214-57.913 | 40.1 | 34.633-45.493 |
| Tabasco | 49.3 | 44.074-54.594 | 32.1 | 26.605-37.512 |
| Tamaulipas | 47.1 | 42.629-51.547 | 37.9 | 32.714-43.021 |
| Tlaxcala | 52.9 | 47.421-58.348 | 29.6 | 24.636-34.638 |
| Veracruz | 46.7 | 41.766-51.677 | 26.3 | 21.249-31.276 |
| Yucatán | 52.8 | 46.154-59.429 | 40.9 | 34.526-47.207 |
| Zacatecas | 57.8 | 51.791-63.764 | 42.7 | 37.288-48.127 |
| Nacional | 51.9 | 50.421-53.391 | 34.4 | 32.967-35.793 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población femenina de 12 a 17 años**

Cuadro ICA22

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 19.4 | 12.658-26.072 | 11.6 | 6.003-17.266 |
| Baja California | 12.4 | 2.506-22.389 | 4.2 | 1.041-7.261 |
| Baja California Sur | 11.9 | 6.417-17.329 | 6.6 | 1.810-11.318 |
| Campeche | 13.2 | 7.862-18.635 | 5.8 | 2.418-9.172 |
| Chiapas | 4.9 | 1.398-8.448 | 2.1 | --- |
| Chihuahua | 16.4 | 9.748-23.077 | 11.0 | 5.369-16.671 |
| Ciudad de México | 18.9 | 10.707-27.004 | 8.4 | 3.632-13.221 |
| Coahuila | 15.1 | 9.538-20.672 | 6.4 | 1.964-10.811 |
| Colima | 18.0 | 8.371-27.598 | 7.6 | 2.960-12.144 |
| Durango | 11.1 | 6.334-15.881 | 5.2 | 2.386-7.994 |
| Estado de México | 17.7 | 9.266-26.110 | 10.0 | 1.948-18.046 |
| Guanajuato | 20.3 | 13.822-26.768 | 7.9 | 2.666-13.184 |
| Guerrero | 10.5 | 6.173-14.864 | 4.2 | 0.987-7.355 |
| Hidalgo | 11.9 | 7.156-16.624 | 4.4 | 1.593-7.300 |
| Jalisco | 28.5 | 16.975-40.078 | 18.5 | 8.220-28.759 |
| Michoacán | 20.1 | 13.698-26.600 | 6.3 | 2.492-10.062 |
| Morelos | 14.4 | 7.097-21.787 | 10.8 | 3.469-18.069 |
| Nayarit | 16.4 | 10.644-22.124 | 8.2 | 4.031-12.359 |
| Nuevo León | 6.9 | 3.672-10.153 | 4.3 | 1.659-6.980 |
| Oaxaca | 6.8 | 2.935-10.632 | 3.8 | 1.174-6.333 |
| Puebla | 12.6 | 6.954-18.306 | 7.3 | 2.840-11.842 |
| Querétaro | 16.6 | 10.877-22.393 | 7.8 | 4.174-11.369 |
| Quintana Roo | 9.5 | 5.202-13.786 | 3.7 | 1.485-5.985 |
| San Luis Potosí | 12.3 | 7.419-17.254 | 7.5 | 3.218-11.778 |
| Sinaloa | 13.9 | 5.298-22.529 | 3.7 | 0.488-6.973 |
| Sonora | 15.4 | 9.506-21.327 | 8.7 | 3.586-13.719 |
| Tabasco | 12.7 | 7.565-17.799 | 7.6 | 3.158-12.032 |
| Tamaulipas | 7.8 | 4.038-11.569 | 4.6 | 1.597-7.648 |
| Tlaxcala | 18.6 | 12.975-24.296 | 8.7 | 4.653-12.801 |
| Veracruz | 11.7 | 6.848-16.492 | 6.0 | 2.147-9.934 |
| Yucatán | 12.3 | 3.245-21.294 | 7.4 | --- |
| Zacatecas | 18.8 | 12.950-24.575 | 12.5 | 7.108-17.866 |
| Nacional | 14.9 | 13.147-16.624 | 7.7 | 6.195-9.160 |

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL Y ESTADOS**

**Consumo excesivo en el último año y en el último mes
en la población femenina de 18 a 65 años**


Cuadro ICA23

| Estado | Encuesta Nacional 2016 | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Consumo Excesivo en el Último Año | | Consumo Excesivo en el Último Mes | |
| | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Aguascalientes | 29.3 | 25.393-33.172 | 14.8 | 12.150-17.385 |
| Baja California | 24.4 | 20.980-27.875 | 13.3 | 10.421-16.174 |
| Baja California Sur | 28.1 | 23.770-32.437 | 16.8 | 13.651-19.946 |
| Campeche | 23.0 | 19.491-26.435 | 10.5 | 7.534-13.441 |
| Chiapas | 12.2 | 8.640-15.758 | 3.6 | 1.625-5.530 |
| Chihuahua | 28.4 | 24.022-32.831 | 14.4 | 11.256-17.464 |
| Ciudad de México | 29.8 | 25.939-33.675 | 12.0 | 8.937-14.995 |
| Coahuila | 24.8 | 20.668-28.954 | 16.7 | 12.993-20.415 |
| Colima | 29.7 | 25.416-33.895 | 13.9 | 10.678-17.144 |
| Durango | 20.3 | 16.420-24.274 | 10.5 | 7.571-13.332 |
| Estado de México | 23.6 | 19.587-27.517 | 10.0 | 6.842-13.234 |
| Guanajuato | 19.1 | 15.635-22.622 | 8.9 | 6.171-11.561 |
| Guerrero | 23.6 | 20.360-26.927 | 6.7 | 4.688-8.668 |
| Hidalgo | 23.9 | 19.499-28.254 | 7.8 | 5.332-10.309 |
| Jalisco | 33.6 | 26.798-40.379 | 16.5 | 11.551-21.430 |
| Michoacán | 23.2 | 19.593-26.871 | 8.5 | 6.349-10.644 |
| Morelos | 21.0 | 16.786-25.142 | 8.7 | 5.543-11.877 |
| Nayarit | 34.7 | 30.169-39.290 | 12.6 | 9.908-15.296 |
| Nuevo León | 27.1 | 22.547-31.735 | 18.1 | 14.260-22.026 |
| Oaxaca | 22.2 | 17.521-26.913 | 7.3 | 5.030-9.485 |
| Puebla | 25.1 | 20.487-29.706 | 8.6 | 4.959-12.251 |
| Querétaro | 23.4 | 18.993-27.792 | 8.5 | 5.655-11.356 |
| Quintana Roo | 31.9 | 27.006-36.766 | 17.8 | 13.434-22.129 |
| San Luis Potosí | 18.3 | 13.743-22.953 | 8.3 | 4.428-12.158 |
| Sinaloa | 22.1 | 18.330-25.879 | 11.1 | 7.978-14.202 |
| Sonora | 26.7 | 22.773-30.562 | 16.4 | 13.039-19.674 |
| Tabasco | 16.6 | 13.133-20.161 | 7.0 | 4.495-9.449 |
| Tamaulipas | 19.3 | 15.336-23.304 | 11.0 | 7.735-14.176 |
| Tlaxcala | 24.3 | 20.652-27.979 | 8.3 | 5.847-10.698 |
| Veracruz | 18.2 | 15.815-20.646 | 6.4 | 4.504-8.253 |
| Yucatán | 26.1 | 21.074-31.145 | 14.6 | 10.675-18.541 |
| Zacatecas | 18.9 | 14.878-22.888 | 7.9 | 5.597-10.270 |
| Nacional | 24.0 | 23.006-25.034 | 10.8 | 10.020-11.555 |

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 4: CONSUMO PER CÁPITA



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CONSUMO PER CÁPITA**

Listado de Tablas

Consumo Per Cápita en la población de 12 a 65 años (1)

Consumo Per Cápita en la población de 15 a 65 años (1)

Consumo Per Cápita en la población de 12 a 65 años (2)

Consumo Per Cápita en la población de 15 a 65 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CONSUMO PER CÁPITA**

Consumo Per Cápita en la población de 12 a 65 años

Cuadro CP1

| LITROS DE ALCOHOL | Encuesta Nacional 2016 | | | | | Total |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | 12 a 17 años | 18 a 29 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más | |
| Sexo | | | | | | |
| Hombres | 3.784 | 11.827 | 7.482 | 6.214 | 3.978 | 7.269 |
| Mujeres | 3.439 | 3.468 | 1.220 | 0.820 | 0.785 | 2.076 |
| Total | 3.613 | 7.612 | 4.054 | 3.285 | 2.362 | 4.583 |

Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CONSUMO PER CÁPITA**

Consumo Per Cápita en la población de 15 a 65 años

Cuadro CP2

| LITROS DE ALCOHOL | Encuesta Nacional 2016 | | | | | Total |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | 15 a 17 años | 18 a 29 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más | |
| Sexo | | | | | | |
| Hombres | 6.506 | 11.827 | 7.482 | 6.214 | 3.978 | 7.868 |
| Mujeres | 5.322 | 3.468 | 1.220 | 0.820 | 0.785 | 2.118 |
| Total | 5.924 | 7.612 | 4.054 | 3.285 | 2.362 | 4.884 |

Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CONSUMO PER CÁPITA**

Consumo Per Cápita en la población de 12 a 65 años

Cuadro CP3

| LITROS DE ALCOHOL Estado | Encuesta Nacional 2016 | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | Hombres | Mujeres | Total |
| Aguascalientes | 10.948 | 3.917 | 7.284 |
| Baja California | 7.500 | 1.749 | 4.654 |
| Baja California Sur | 6.556 | 2.418 | 4.542 |
| Campeche | 10.649 | 1.909 | 6.175 |
| Chiapas | 3.637 | 0.656 | 2.084 |
| Chihuahua | 7.503 | 3.389 | 5.418 |
| Ciudad de México | 6.867 | 2.350 | 4.508 |
| Coahuila | 10.864 | 2.563 | 6.666 |
| Colima | 9.180 | 2.554 | 5.845 |
| Durango | 9.062 | 1.838 | 5.328 |
| Estado de México | 4.475 | 1.601 | 2.983 |
| Guanajuato | 7.665 | 1.931 | 4.643 |
| Guerrero | 6.201 | 1.332 | 3.659 |
| Hidalgo | 6.296 | 1.221 | 3.629 |
| Jalisco | 10.706 | 4.333 | 7.431 |
| Michoacán | 12.362 | 1.366 | 6.611 |
| Morelos | 7.107 | 1.680 | 4.261 |
| Nayarit | 7.143 | 1.790 | 4.430 |
| Nuevo León | 10.117 | 3.831 | 6.937 |
| Oaxaca | 4.206 | 3.034 | 3.584 |
| Puebla | 4.022 | 0.851 | 2.336 |
| Querétaro | 8.974 | 1.608 | 5.121 |
| Quintana Roo | 9.432 | 2.937 | 6.238 |
| San Luis Potosí | 8.598 | 1.683 | 5.001 |
| Sinaloa | 6.751 | 1.235 | 3.965 |
| Sonora | 5.338 | 2.302 | 3.817 |
| Tabasco | 9.090 | 1.474 | 5.152 |
| Tamaulipas | 5.623 | 2.958 | 4.267 |
| Tlaxcala | 4.578 | 1.446 | 2.937 |
| Veracruz | 8.605 | 1.213 | 4.760 |
| Yucatán | 6.655 | 2.789 | 4.668 |
| Zacatecas | 9.466 | 1.538 | 5.314 |
| Nacional | 7.269 | 2.076 | 4.583 |

Porcentajes obtenidos según sexo

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CONSUMO PER CÁPITA**

Consumo Per Cápita en la población de 15 a 65 años

Cuadro CP4

| LITROS DE ALCOHOL Estado | Encuesta Nacional 2016 | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | Hombres | Mujeres | Total |
| Aguascalientes | 12.116 | 4.240 | 7.994 |
| Baja California | 8.032 | 1.908 | 5.027 |
| Baja California Sur | 7.086 | 2.601 | 4.911 |
| Campeche | 11.870 | 2.015 | 6.771 |
| Chiapas | 4.080 | 0.718 | 2.310 |
| Chihuahua | 7.855 | 3.666 | 5.736 |
| Ciudad de México | 7.294 | 2.296 | 4.667 |
| Coahuila | 11.607 | 2.694 | 7.130 |
| Colima | 9.946 | 2.614 | 6.225 |
| Durango | 9.848 | 2.009 | 5.811 |
| Estado de México | 4.838 | 1.257 | 2.962 |
| Guanajuato | 8.327 | 2.028 | 5.015 |
| Guerrero | 6.929 | 1.469 | 4.050 |
| Hidalgo | 6.929 | 1.310 | 3.943 |
| Jalisco | 11.555 | 4.444 | 7.918 |
| Michoacán | 13.627 | 1.464 | 7.190 |
| Morelos | 7.418 | 1.779 | 4.431 |
| Nayarit | 7.833 | 1.795 | 4.724 |
| Nuevo León | 10.822 | 4.090 | 7.441 |
| Oaxaca | 4.707 | 3.325 | 3.971 |
| Puebla | 4.500 | 0.926 | 2.582 |
| Querétaro | 8.708 | 1.565 | 4.937 |
| Quintana Roo | 10.233 | 2.988 | 6.656 |
| San Luis Potosí | 9.233 | 1.761 | 5.343 |
| Sinaloa | 7.380 | 1.369 | 4.372 |
| Sonora | 5.843 | 2.399 | 4.105 |
| Tabasco | 9.471 | 1.574 | 5.388 |
| Tamaulipas | 6.136 | 3.185 | 4.629 |
| Tlaxcala | 4.702 | 1.213 | 2.861 |
| Veracruz | 9.414 | 1.310 | 5.185 |
| Yucatán | 7.259 | 2.936 | 5.026 |
| Zacatecas | 10.357 | 1.390 | 5.648 |
| Nacional | 7.868 | 2.118 | 4.884 |

Porcentajes obtenidos según sexo y edad

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



**ANEXO 5: CUADROS
DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL

Listado de Tablas

Usuarios de 12 a 65 años que han recibido tratamiento por consumo de alcohol según sexo y edad

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años según sexo (1)

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años (1)

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población masculina (1)

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población femenina (1)

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años según sexo (2)

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años (2)

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población masculina (2)

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población femenina (2)

Población de 12 a 65 años que acudió a consultar algún profesional de la salud por su consumo de alcohol según sexo

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población de 12 a 65 años

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población masculina de 12 a 65 años

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población femenina de 12 a 65 años

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL

Usuarios de 12 a 65 años que han recibido tratamiento por consumo de alcohol según sexo y edad

Cuadro CTA1

| Sexo/Edad | N | % |
|-----------------|-----------|-----|
| Hombres | | |
| 12-17 | 19 742 | 2.7 |
| 18-34 | 373 116 | 4.1 |
| 35-65 | 588 265 | 6.3 |
| Subtotal | 981 122 | 5.1 |
| Mujeres | | |
| 12-17 | 14 335 | 2.6 |
| 18-34 | 42 650 | 0.9 |
| 35-65 | 37 887 | 1.3 |
| Subtotal | 94 872 | 1.2 |
| Total | 1 075 994 | 3.9 |

Porcentajes obtenidos de la población que consume alcohol según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTA2

| N por subgrupo | Hombres | | Mujeres | | Total | |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|-----------|------|
| | 981 122 | | 94 872 | | 1 075 994 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Tratamiento de desintoxicación | 213 811 | 21.8 | 12 733 | 13.5 | 226 544 | 21.1 |
| Tratamiento residencial | 130 113 | 13.3 | 2 148 | 2.3 | 132 261 | 12.3 |
| Tratamiento ambulatorio | 81 270 | 8.3 | 14 090 | 14.9 | 95 359 | 8.9 |
| Tratamiento por internet | 29 255 | 3.0 | 8 815 | 9.3 | 38 070 | 3.5 |
| Tratamiento en un anexo | 279 408 | 28.5 | 21 228 | 22.4 | 300 636 | 27.9 |

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años

Cuadro CTA3

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|--------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 237 237 | | 212 605 | | 626 152 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Tratamiento de desintoxicación | 48 446 | 20.4 | 37 732 | 17.8 | 140 367 | 22.4 |
| Tratamiento residencial | 35 545 | 15.0 | 23 665 | 11.1 | 73 051 | 11.7 |
| Tratamiento ambulatorio | 26 215 | 11.1 | 17 371 | 8.2 | 51 773 | 8.3 |
| Tratamiento por internet | 18 268 | 7.7 | 1 166 | 0.5 | 18 636 | 3.0 |
| Tratamiento en un anexo | 71 311 | 30.1 | 59 765 | 28.1 | 169 559 | 27.1 |

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población masculina

Cuadro CTA4

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|--------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 186 100 | | 206 757 | | 588 265 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Tratamiento de desintoxicación | 38 129 | 20.5 | 36 928 | 17.9 | 138 754 | 23.6 |
| Tratamiento residencial | 33 615 | 18.1 | 23 665 | 11.4 | 72 833 | 12.4 |
| Tratamiento ambulatorio | 18 895 | 10.2 | 17 371 | 8.4 | 45 003 | 7.7 |
| Tratamiento por internet | 10 948 | 5.9 | 1 166 | 0.6 | 17 141 | 2.9 |
| Tratamiento en un anexo | 67 966 | 36.5 | 56 644 | 27.4 | 154 798 | 26.3 |

Porcentajes obtenidos de la población masculina que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población femenina

Cuadro CTA5

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|--------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 51 137 | | 5 848 | | 37 887 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Tratamiento de desintoxicación | 10 317 | 20.2 | 804 | 15.0 | 1 613 | 4.3 |
| Tratamiento residencial | 1 930 | 3.8 | -- | -- | 218 | 0.6 |
| Tratamiento ambulatorio | 7 320 | 14.3 | -- | -- | 6 769 | 17.9 |
| Tratamiento por internet | 7 320 | 14.3 | -- | -- | 1 495 | 3.9 |
| Tratamiento en un anexo | 3 345 | 6.5 | 3 121 | 53.4 | 14 761 | 39.0 |

Porcentajes obtenidos de la población femenina que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTA6

| N por subgrupo | Hombres | | Mujeres | | Total | |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|-----------|------|
| | 867 736 | | 180 033 | | 1 047 769 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Completo con profesionalista | 168 910 | 20.3 | 49 072 | 29.2 | 217 982 | 21.8 |
| Parcial con profesionalista | 367 471 | 44.1 | 99 034 | 59.0 | 466 505 | 46.6 |
| Autoayuda | 268 142 | 32.2 | 19 738 | 11.8 | 287 881 | 28.8 |
| Otro tipo | 27 919 | 3.4 | -- | -- | 27 919 | 2.8 |

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años

Cuadro CTA7

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 313 063 | | 216 129 | | 518 578 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Completo con profesionalista | 77 594 | 26.2 | 49 451 | 23.8 | 90 937 | 18.3 |
| Parcial con profesionalista | 176 202 | 59.4 | 84 642 | 40.7 | 205 661 | 41.5 |
| Autoayuda | 38 056 | 12.8 | 72 060 | 34.7 | 177 765 | 35.8 |
| Otro tipo | 4 723 | 1.6 | 1 653 | 0.8 | 21 544 | 4.3 |

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población masculina

Cuadro CTA8

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 235 831 | | 178 596 | | 453 309 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Completo con profesionalista | 56 571 | 25.1 | 46 364 | 26.7 | 65 974 | 15.2 |
| Parcial con profesionalista | 126 662 | 56.3 | 61 750 | 35.6 | 179 059 | 41.3 |
| Autoayuda | 37 116 | 16.5 | 63 620 | 36.7 | 167 406 | 38.6 |
| Otro tipo | 4 723 | 2.1 | 1 653 | 1.0 | 21 544 | 5.0 |

Porcentajes obtenidos de la población masculina que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Tipo de tratamiento de los usuarios de alcohol de 12 a 65 años en la población femenina

Cuadro CTA9

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 77 231 | | 37 533 | | 65 268 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Completo con profesionalista | 21 023 | 29.4 | 3 086 | 9.0 | 24 963 | 40.3 |
| Parcial con profesionalista | 49 540 | 69.3 | 22 892 | 66.5 | 26 602 | 43.0 |
| Autoayuda | 939 | 1.3 | 8 440 | 24.5 | 10 359 | 16.7 |
| Otro tipo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Porcentajes obtenidos de la población femenina que ha recibido tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

**Población de 12 a 65 años que acudió a consultar algún profesional de la salud
por su consumo de alcohol según sexo**

Cuadro CTA10

| N por subgrupo | Hombres | | Mujeres | | Total | |
|---|---------|------|---------|------|-----------|------|
| | 867 736 | | 180 033 | | 1 047 769 | |
| Profesional al que acudió | N | % | N | % | N | % |
| Psiquiatra | 223 681 | 25.8 | 56 581 | 31.4 | 280 262 | 26.7 |
| Médico familiar o general | 234 288 | 27.0 | 56 130 | 31.2 | 290 418 | 27.7 |
| Otro médico especialista | 95 084 | 11.0 | 36 742 | 20.4 | 131 826 | 12.6 |
| Psicólogo | 325 982 | 37.6 | 122 493 | 68.0 | 448 475 | 42.8 |
| Trabajadora Social | 219 564 | 25.3 | 35 772 | 19.9 | 255 335 | 24.4 |
| Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud | 152 385 | 17.6 | 17 981 | 10.0 | 170 365 | 16.3 |
| Terapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente | 87 553 | 10.1 | 7 145 | 4.0 | 94 698 | 9.0 |
| Consejero espiritual | 238 274 | 27.5 | 41 038 | 22.8 | 279 312 | 26.7 |
| Grupo de autoayuda | 550 334 | 63.4 | 63 368 | 35.2 | 613 702 | 58.6 |
| Un curandero/ yerbero | 116 803 | 13.5 | 9 109 | 5.1 | 125 911 | 12.0 |
| Consultó a algún otro especialista | 42 338 | 4.9 | 1 703 | 1.0 | 44 041 | 4.2 |

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento con profesionales por su consumo de alcohol según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTA11

| N por subgrupo | Hombres 18 403 475 | | Mujeres 7 979 497 | | Total 26 382 971 | |
|---|-----------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|
| | N | % | N | % | N | % |
| Usted no consultó a un profesional por su uso de alcohol porque: | | | | | | |
| Pensó que no tenía un problema | 5 486 294 | 30.3 | 2 030 075 | 25.8 | 7 516 369 | 28.9 |
| Pensó que podría resolverlo solo | 4 594 735 | 25.3 | 1 156 454 | 14.7 | 5 751 189 | 22.0 |
| Creyó que el tratamiento no le ayudaría | 1 504 693 | 8.3 | 415 492 | 5.3 | 1 920 186 | 7.4 |
| No sabe a dónde acudir | 1 594 219 | 8.8 | 464 187 | 5.9 | 2 058 407 | 7.9 |
| No acudió por vergüenza | 1 198 889 | 6.5 | 333 273 | 4.2 | 1 532 162 | 5.8 |
| Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia | 1 561 256 | 8.9 | 422 844 | 5.7 | 1 984 099 | 7.9 |
| No cuenta con suficientes recursos económicos | 1 391 010 | 7.7 | 348 278 | 4.5 | 1 739 288 | 6.7 |
| Su seguro médico no cubre este tratamiento | 812 442 | 4.6 | 267 504 | 3.5 | 1 079 946 | 4.3 |
| El problema se acabó solo | 3 463 581 | 19.2 | 1 453 174 | 18.6 | 4 916 755 | 19.1 |
| Pensó que el problema mejoraría solo | 4 353 176 | 24.0 | 1 518 156 | 19.4 | 5 871 333 | 22.6 |
| Le preocupa lo que la gente piense de usted | 909 554 | 5.0 | 280 712 | 3.6 | 1 190 265 | 4.5 |
| Pensó que le tomaría mucho tiempo | 1 300 757 | 7.2 | 368 946 | 4.7 | 1 669 702 | 6.4 |
| No podía conseguir una cita | 471 399 | 2.7 | 113 670 | 1.5 | 585 069 | 2.3 |
| No deseaba ser internado en contra de su voluntad | 1 356 277 | 7.5 | 401 600 | 5.1 | 1 757 877 | 6.7 |
| No estaba satisfecho con los servicios disponibles | 1 165 028 | 6.6 | 322 549 | 4.2 | 1 487 578 | 5.9 |
| Había recibido tratamiento antes y no había funcionado | 283 741 | 1.6 | 40 548 | 0.5 | 324 290 | 1.2 |
| El problema no le molesta mucho | 1 171 178 | 6.4 | 413 397 | 5.3 | 1 584 575 | 6.1 |
| Le resulta difícil llegar a l sitio donde lo atenderán | 628 336 | 3.5 | 149 542 | 1.9 | 777 878 | 3.0 |
| Cualquier otra | 415 486 | 2.3 | 122 633 | 1.6 | 538 119 | 2.1 |

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de alcohol, según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población de 12 a 65 años

Cuadro CTA12

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| | N | % | N | % | N | % |
| Usted no consultó a un profesional por su uso de alcohol porque: | | | | | | |
| Pensó que no tenía un problema | 2 390 555 | 30.0 | 1 869 085 | 28.8 | 3 256 729 | 28.2 |
| Pensó que podría resolverlo solo | 1 650 042 | 20.5 | 1 221 016 | 18.8 | 2 880 131 | 25.0 |
| Creyó que el tratamiento no le ayudaría | 497 164 | 6.2 | 486 138 | 7.5 | 936 884 | 8.2 |
| No sabe a dónde acudir | 657 686 | 8.3 | 423 684 | 6.5 | 977 037 | 8.5 |
| No acudió por vergüenza | 405 734 | 5.0 | 274 494 | 4.2 | 851 933 | 7.3 |
| Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia | 601 524 | 7.8 | 462 676 | 7.5 | 919 900 | 8.3 |
| No cuenta con suficientes recursos económicos | 498 279 | 6.3 | 441 105 | 6.8 | 799 904 | 6.9 |
| Su seguro médico no cubre este tratamiento | 348 733 | 4.6 | 302 079 | 4.9 | 429 134 | 3.8 |
| El problema se acabó solo | 1 665 567 | 21.3 | 1 005 727 | 15.6 | 2 245 461 | 19.5 |
| Pensó que el problema mejoraría solo | 1 913 596 | 24.0 | 1 255 248 | 19.5 | 2 702 489 | 23.5 |
| Le preocupa lo que la gente piense de usted | 349 078 | 4.3 | 260 109 | 4.0 | 581 078 | 5.0 |
| Pensó que le tomaría mucho tiempo | 509 051 | 6.3 | 401 332 | 6.2 | 759 320 | 6.6 |
| No podía conseguir una cita | 183 439 | 2.3 | 149 399 | 2.4 | 252 231 | 2.2 |
| No deseaba ser internado en contra de su voluntad | 637 157 | 7.9 | 343 867 | 5.3 | 776 852 | 6.7 |
| No estaba satisfecho con los servicios disponibles | 420 672 | 5.4 | 385 199 | 6.1 | 681 707 | 6.1 |
| Había recibido tratamiento antes y no había funcionado | 97 809 | 1.2 | 63 560 | 1.0 | 162 920 | 1.4 |
| El problema no le molesta mucho | 531 155 | 6.6 | 373 664 | 5.8 | 679 756 | 5.9 |
| Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán | 241 093 | 3.1 | 180 938 | 2.8 | 355 846 | 3.1 |
| Cualquier otra | 146 906 | 1.9 | 97 508 | 1.5 | 293 705 | 2.6 |

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro CTA13

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 5 207 173 | | 4 296 908 | | 8 899 393 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Usted no consultó a un profesional por su uso de alcohol porque: | | | | | | |
| Pensó que no tenía un problema | 1 595 932 | 31.4 | 1 280 972 | 30.3 | 2 609 390 | 29.7 |
| Pensó que podría resolverlo solo | 1 218 125 | 23.7 | 891 036 | 20.9 | 2 485 573 | 28.3 |
| Creyó que el tratamiento no le ayudaría | 368 225 | 7.2 | 345 647 | 8.2 | 790 821 | 9.0 |
| No sabe a dónde acudir | 487 185 | 9.6 | 302 477 | 7.1 | 804 557 | 9.2 |
| No acudió por vergüenza | 271 304 | 5.3 | 222 467 | 5.2 | 705 118 | 8.0 |
| Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia | 421 787 | 8.5 | 366 226 | 9.0 | 773 243 | 9.1 |
| No cuenta con suficientes recursos económicos | 362 878 | 7.1 | 359 517 | 8.5 | 668 616 | 7.6 |
| Su seguro médico no cubre este tratamiento | 246 845 | 5.0 | 216 366 | 5.3 | 349 231 | 4.1 |
| El problema se acabó solo | 1 034 648 | 20.8 | 650 168 | 15.4 | 1 778 764 | 20.2 |
| Pensó que el problema mejoraría solo | 1 288 957 | 25.2 | 862 931 | 20.4 | 2 201 288 | 25.0 |
| Le preocupa lo que la gente piense de usted | 215 048 | 4.2 | 209 361 | 4.9 | 485 145 | 5.5 |
| Pensó que le tomaría mucho tiempo | 358 702 | 7.0 | 301 792 | 7.2 | 640 262 | 7.3 |
| No podía conseguir una cita | 137 444 | 2.7 | 124 606 | 3.0 | 209 349 | 2.4 |
| No deseaba ser internado en contra de su voluntad | 431 283 | 8.4 | 268 809 | 6.3 | 656 185 | 7.4 |
| No estaba satisfecho con los servicios disponibles | 324 707 | 6.5 | 296 847 | 7.1 | 543 474 | 6.3 |
| Había recibido tratamiento antes y no había funcionado | 81 304 | 1.6 | 58 671 | 1.4 | 143 766 | 1.6 |
| El problema no le molesta mucho | 369 424 | 7.2 | 255 302 | 6.0 | 546 452 | 6.2 |
| Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán | 167 506 | 3.3 | 143 490 | 3.4 | 317 339 | 3.6 |
| Cualquier otra | 93 571 | 1.9 | 66 518 | 1.6 | 255 398 | 2.9 |

Porcentajes obtenidos de la población masculina que no ha acudido a tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL**

Razones para no consultar a un profesional por uso de alcohol en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro CTA14

| N por subgrupo | 12-25 años | | 26-34 años | | 35-65 años | |
|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 2 941 854 | | 2 280 248 | | 2 757 394 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Usted no consultó a un profesional por su uso de alcohol porque: | | | | | | |
| Pensó que no tenía un problema | 794 623 | 27.6 | 588 113 | 26.1 | 647 339 | 23.6 |
| Pensó que podría resolverlo solo | 431 917 | 14.9 | 329 980 | 14.7 | 394 557 | 14.4 |
| Creyó que el tratamiento no le ayudaría | 128 939 | 4.5 | 140 490 | 6.3 | 146 063 | 5.4 |
| No sabe a dónde acudir | 170 501 | 5.9 | 121 206 | 5.4 | 172 480 | 6.4 |
| No acudió por vergüenza | 134 430 | 4.6 | 52 028 | 2.3 | 146 816 | 5.3 |
| Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia | 179 737 | 6.6 | 96 450 | 4.5 | 146 657 | 5.6 |
| No cuenta con suficientes recursos económicos | 135 401 | 4.7 | 81 588 | 3.6 | 131 288 | 4.8 |
| Su seguro médico no cubre este tratamiento | 101 888 | 3.7 | 85 713 | 4.0 | 79 903 | 3.0 |
| El problema se acabó solo | 630 918 | 22.1 | 355 559 | 16.0 | 466 696 | 17.2 |
| Pensó que el problema mejoraría solo | 624 638 | 21.7 | 392 317 | 17.6 | 501 201 | 18.5 |
| Le preocupa lo que la gente piense de usted | 134 030 | 4.6 | 50 748 | 2.2 | 95 933 | 3.5 |
| Pensó que le tomaría mucho tiempo | 150 349 | 5.2 | 99 539 | 4.4 | 119 058 | 4.4 |
| No podía conseguir una cita | 45 995 | 1.6 | 24 793 | 1.1 | 42 883 | 1.6 |
| No deseaba ser internado en contra de su voluntad | 205 874 | 7.1 | 75 058 | 3.3 | 120 668 | 4.4 |
| No estaba satisfecho con los servicios disponibles | 95 966 | 3.4 | 88 352 | 4.0 | 138 232 | 5.2 |
| Había recibido tratamiento antes y no había funcionado | 16 505 | 0.6 | 4 889 | 0.2 | 19 154 | 0.7 |
| El problema no le molesta mucho | 161 732 | 5.6 | 118 362 | 5.3 | 133 304 | 4.9 |
| Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán | 73 587 | 2.6 | 37 448 | 1.7 | 38 507 | 1.4 |
| Cualquier otra | 53 335 | 1.9 | 30 991 | 1.4 | 38 307 | 1.4 |

Porcentajes obtenidos de la población femenina que no ha acudido a tratamiento por su consumo de alcohol según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz




ANEXO 6: MAPAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL



Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017


Resultados Nacionales de Alcohol

Consumo de Alcohol Alguna Vez en Población Total




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Alcohol Alguna Vez en Población Total por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Alcohol en el Último Año en Población Total




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Alcohol en el Último Año en Población Total por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Alcohol en el Último Mes en Población Total




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Alcohol en el Último Mes en Población Total por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes en Población Total



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.


Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes en Población de 12 a 17 años



Total Nacional = 8.3%
IC 95% 7.334-9.228

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.


Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes en Población de 18 a 65 años



Total Nacional = 22.1%
IC 95% 21.221-22.921

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.


Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Año en Población Total



Total Nacional = 33.6%
IC 95% 32.803-34.458

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Año en Población de 12 a 17 años



Total Nacional = 15.2%
IC 95% 14.029-16.365


Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Año en Población de 18 a 65 años

Total Nacional = 37.4%
IC 95% 36.400-38.313

5 copas o más en una sola ocasión en el caso de los hombres, o 4 copas o más en una sola ocasión para las mujeres, en el último año.

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo Consuetudinario de Alcohol en Población Total

Total Nacional = 8.5%
IC 95% 7.974-8.968

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo Diario de Alcohol en Población Total

Total Nacional = 2.9%
IC 95% 2.665-3.173

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Dependencia al Alcohol en Población Total


Total Nacional = 2.2%
IC 95% 1.901-2.519

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo Per Cápita en Población de 15 a 65 años



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

**Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016-2017: Reporte de Alcohol.** Se terminó de imprimir en
septiembre del 2017 en Editores Buena Onda S.A. de C.V. Suiza
Nº 14 Col. Portales Oriente C.P. 03570, Delegación Benito
Juárez, México D.F. con un tiraje de 2000 ejemplares.