



objetivos de las preguntas incluidas en el cuestionario. En la segunda semana, las actividades de los grupos A y B se intercambiaron. El equipo de *Cartografía* se capacitó del 2 al 13 de mayo de 2016.

La capacitación referente a la logística del trabajo de campo, aspectos éticos de la encuesta, Tabaquismo y el cuestionario de hogar, estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en tanto que los temas sobre el consumo de alcohol y drogas fueron impartidos por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) proporcionó la capacitación de la sección de Genética. Adicionalmente, derivado del clima de inseguridad por el que atraviesa nuestro país y con la finalidad de proteger al personal operativo, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal quien participó con la impartición de un taller sobre la identificación de situaciones de riesgo y prevención del delito de alto impacto. El operativo de la ENCODAT 2015-2017 se desarrolló entre el 1 de junio al 30 de octubre de 2016. Para cada vivienda seleccionada se programaron hasta 4 visitas en horarios y días diferentes e incluyendo fines de semana, para incrementar la probabilidad de encontrar a los ocupantes.

Supervisión del operativo

Los coordinadores de ruta y los supervisores fueron los encargados de supervisar directamente las entrevistas y de verificar la correcta ubicación de las viviendas. El trabajo de supervisión consideró dos fases:

Planeación y Organización. En esta etapa el supervisor de campo agrupó zonas o áreas de trabajo colindantes entre sí para optimizar el tiempo de levantamiento y asignó las cargas de trabajo a cada entrevistador que tuvo a su cargo.

Supervisión en Campo. Durante el periodo de realización de entrevistas, el supervisor informó a los entrevistadores sobre las dudas o problemas surgidos durante el desarrollo de las actividades. Adicionalmente, el supervisor verificó que los individuos y hogares entrevistados fueran los seleccionados, observó directamente 1 de cada 5 entrevistas en su área de responsabilidad y confirmó el 100% de los códigos de no respuesta.

Como complemento al trabajo de los supervisores, se formaron dos equipos de supervisión ajenos a la estructura operativa de la encuesta, un equipo dirigido y conformado por investigadores del INPRFM y otro equipo dirigido y conformado por investigadores del INSP. Los equipos mencionados monitorearon regularmente las actividades del trabajo de campo en las entidades federativas; también, a partir de análisis preliminares de los cuestionarios colectados, se propusieron acciones destinadas a mejorar el desarrollo de la encuesta.

Consideraciones Éticas

El protocolo de investigación de la encuesta fue evaluado y aprobado por las Comisiones de Investigación y Ética tanto del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz como del Instituto Nacional de Salud Pública. A todos los participantes les fue leída una carta de consentimiento informado y se recabó información sólo de quienes aceptaron participar. En el caso



de los menores de edad, se solicitó a los padres o tutores su autorización para que sus hijo(as) fueran invitados (as) a participar en la encuesta, cuando accedieron, firmaron una carta de consentimiento y posteriormente se buscó el asentimiento del menor. Durante la lectura de las cartas de consentimiento y asentimiento se hizo énfasis en los objetivos de la encuesta, el tipo de información que se buscaba recolectar, el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de la información.

Tasa de Respuesta

La no respuesta ocurre cuando resulta imposible conocer algún atributo de interés “Y” en un hogar seleccionado o en una persona seleccionada para la encuesta. En la ENCODAT 2016-2017 se calcularon tres tasas de respuesta: *colectiva*, *de hogar* e *individual*. La *no respuesta colectiva* describe el no acceso a áreas seleccionadas: localidades, AGEB o manzanas seleccionadas. Los motivos de no acceso son básicamente dos: inseguridad o desacuerdo de grupos de habitantes para participar en la encuesta. La *no respuesta de hogar* describe las razones por las que no fue posible obtener respuesta para el cuestionario de hogar, los motivos más frecuente de la no respuesta de hogar son el rechazo o la ausencia de personas. La *no respuesta individual* describe los motivos por los que las personas seleccionadas no participan en la encuesta. La tasa de respuesta global se definió como producto de las tres tasas de respuesta (*colectiva*, *hogares*, *individuos*). A continuación, se presentan las tasas de respuesta mencionadas.

La tasa de respuesta *colectiva* fue del 95.28% (66 582/69 879) en la muestra original de manzanas y localidades ENCODAT 2016-2017 y del 95.17% (70 756/74 347) en la muestra total de manzanas y localidades, esto es, la muestra que resultó de añadir las AGEB necesarias para compensar la no respuesta colectiva. La tasa de respuesta colectiva se calcula con respecto a viviendas asignadas a localidades y manzanas. Se aclara que la diferencia en el total de viviendas referido en la Tabla 4 y el total de hogares visitados se debe a dos razones: Cuando se identificó una vivienda deshabitada, se añadió a la muestra la vivienda contigua a la derecha y por la adición de viviendas de la muestra réplica en lugares o localidades donde no fue posible acceder a las viviendas seleccionadas.

Tabla 4. Resultado de las visitas del equipo de cartógrafos a las viviendas asignadas

Resultado	Muestra Original de localidades y manzanas		Muestra Total de localidades y manzanas	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Visitadas	66 582	95%	70 756	95%
Inseguridad y narcotráfico	832	1%	915	1%
No acceso y localidades lejanas	1 106	2%	1 223	2%
No viviendas (reclusorios)*	166	0%	180	0%
Zona residencial	1 359	2%	1 453	2%
Total	70 045	100%	74 527	100%

* =Omitida del cálculo de la no respuesta

La tasa de respuesta en hogares se calculó como el cociente entre el número de entrevistas de hogar completas y el total de hogares que era posible visitar; esto es, se eliminaron del cálculo las viviendas



temporales y deshabitadas. En la Tabla 5 se presentan las tasas de respuesta de hogares: a) 88.35% (52 488/59 381) en hogares donde se aplicó el cuestionario ENCODAT 2016-2017 y pertenecen a localidades/manzanas de la muestra original de AGEB/localidades, b) 88.34% (55 907/63 285) en hogares donde se aplicó el cuestionario ENCODAT y c) 88.44% (61 250/69 251) en hogares donde se aplicó el cuestionario ENCODAT o el cuestionario ENA Tradicional.

La tasa de respuesta en individuos se calculó como el cociente entre el número de entrevistas de individuo completas y el total de individuos que era posible entrevistar; se eliminaron del cálculo los individuos que al momento de la entrevista reportaron tener una edad menor a 12 años o mayor a 65 años. La Tabla 6 presenta las tasas de respuesta de individuos: a) 87.03% (53 313/61 219) en individuos donde se aplicó el cuestionario ENCODAT 2016-2017 y pertenecen a localidades/manzanas de la muestra original de AGEB/localidades, b) 87.12% (56 877/65 243) en individuos donde se aplicó el cuestionario ENCODAT y c) 87.49% (62 684/71 602) en individuos donde se aplicó el cuestionario ENCODAT o el cuestionario ENA Tradicional. Resumiendo, puede considerarse que la tasa de respuesta global fue de 73.64% ($0.8749 \times 0.9517 \times 0.8844$).

Tabla 5. Resultado de las entrevistas de hogar

Resultado	Original ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016-2017 y ENA Tradicional	
	N	%	N	%	N	%
Entrevista completa	52 468	85	55 907	85	61 250	85
Entrevista incompleta	19	0	20	0	21	0
Informante inadecuado	89	0	95	0	100	0
Entrevista aplazada	5	0	6	0	6	0
Informantes ausentes	3 067	5	3 306	5	3 594	5
Entrevista negativa	3 327	5	3 529	5	3 818	5
Vivienda deshabitada	1 100	2	1 176	2	1 258	2
Vivienda temporal	1 026	2	1 086	2	1 199	2
Vivienda no localizada	5	0	5	0	6	0
Otro	401	1	417	1	456	1
Total	61 507	100	65 547	100	71 708	100

Finalmente, en el anexo A se presentan las tasas de respuesta estatales para los hogares e individuos donde se aplicaron los cuestionarios ENCODAT 2016-2017, así como las tasas de respuesta estatales colectivas.




Tabla 6. Resultado de las entrevistas individuales

Resultado	Original ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016-2017 y ENA Tradicional	
	N	%	N	%	N	%
Entrevista completa	53,313	87	56,877	87	62,684	87
Entrevistado fuera de rango*	39	0	42	0	45	0
Entrevista incompleta	65	0	71	0	72	0
Informante inadecuado	403	1	432	1	467	1
Entrevista aplazada	6	0	8	0	8	0
Ocupantes ausentes	3,290	5	3,504	5	3,704	5
Negativa a dar información	2,035	3	2,149	3	2,281	3
Otro	155	0	162	0	172	0
Cancelada por calidad	1,952	3	2,040	3	2,214	3
Total	61 258	100	65 285	100	71 647	100

* = Omitida del cálculo de la no respuesta



RESULTADOS PRINCIPALES





RESULTADOS PRINCIPALES

En esta sección se describen los resultados principales de drogas. Se presentan prevalencias sobre algunos factores relacionados con el consumo, tales como la exposición a la prevención y al consumo de drogas, percepción de riesgo y tolerancia social, así como las prevalencias y tendencias de consumo a nivel estatal y regional; además se presentan las tendencias de edad de inicio del consumo de drogas y porcentajes de dificultades relacionadas al consumo, tratamiento y necesidades de atención.

Prevalencias y tendencias del consumo de drogas

a) Población Total

En la población total, el consumo de cualquier droga, de drogas ilegales y de marihuana alguna vez en la vida ha aumentado significativamente entre el 2011 y el 2016, al pasar de 7.8%, 7.2% y 6% a 10.3%, 9.9% y 8.6% (respectivamente).

El consumo de las demás drogas se mantuvo estable. Esta situación se repite en ambos sexos, pues en hombres aumentó el consumo de cualquier droga de 13% a 16.2%, drogas ilegales de 12.5% a 15.8% y marihuana de 10.6% a 14%. En mujeres incrementa cerca de 2 veces el consumo de marihuana (de 1.6% en 2011 a 3.7% en 2016), y de drogas ilegales (de 2.3% a 4.3%) y en cualquier droga aumenta de 3% a 4.8% (Cuadro 1A).

Con respecto a las prevalencias de consumo de drogas en el último año, siguen el mismo patrón que las prevalencias de alguna vez; el consumo de cualquier droga incrementó de 1.8% a 2.9%, el de drogas ilegales pasó de 1.5% a 2.7% y el consumo de marihuana de 1.2% a 2.1% en la población total. En hombres aumentó el consumo de cualquier droga en el último año (3% en 2011 a 4.6% en 2016), de drogas ilegales (de 2.6% a 4.4%) y marihuana (de 2.2% a 3.5%); en las mujeres el crecimiento fue mayor, al triplicarse el consumo en la prevalencia de marihuana en el último año (de 0.3% a 0.9%) y de drogas ilegales (0.4% a 1.1%) y al duplicarse el consumo de cualquier droga de 0.7% a 1.3% (Cuadro 1B).

En cuanto a la dependencia a drogas en el último año, es reportada por el 0.6% de la población, (1.1% en hombres y 0.2% mujeres) y aunque existe una gran diferencia en los porcentajes entre ambos sexos, esta es más evidente en hombres (2%) y mujeres (0.3%) entre 18 y 34 años (Gráfica 1).



**Cuadro 1A: Tendencias del consumo de drogas alguna vez.
Población de 12 a 65 años**

	2002	2008		2011		2016
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	3.5	4.2	6.0	5.367-6.570	8.6*	8.184-9.114
Cocaína	1.2	2.4	3.3	2.828-3.680	3.5	3.231-3.819
Crack	0.1	0.6	1.0	0.736-1.294	0.9	0.736-0.991
Alucinógenos	0.3	0.4	0.7	0.451-0.945	0.7	0.542-0.825
Inhalables	0.5	0.7	0.9	0.656-1.170	1.1	0.942-1.287
Heroína	0.1	0.1	0.2	0.055-0.394	0.2	0.097-0.244
Metanfetaminas	0.1	0.5	0.8	0.551-1.085	0.9	0.731-1.013
Drogas Ilegales	4.1	5.2	7.2	6.568-7.864	9.9*	9.372-10.391
Cualquier Droga	5.0	5.7	7.8	7.168-8.495	10.3*	9.788-10.813
Hombres						
Mariguana	6.9	7.2	10.6	9.499-11.692	14.0*	13.130-14.804
Cocaína	2.2	4.1	5.9	5.111-6.774	6.2	5.624-6.727
Crack	0.2	1.0	2.0	1.390-2.521	1.5	1.295-1.793
Alucinógenos	0.5	0.6	1.1	0.671-1.589	1.0	0.756-1.228
Inhalables	0.9	1.3	1.5	1.040-2.053	1.7	1.399-2.021
Heroína	0.2	0.3	0.4	0.100-0.800	0.3	0.189-0.494
Metanfetaminas	0.1	0.8	1.3	0.781-1.726	1.4	1.154-1.595
Drogas Ilegales	8.0	8.8	12.5	11.308-13.720	15.8*	14.938-16.757
Cualquier Droga	8.6	9.1	13.0	11.793-14.215	16.2*	15.240-17.062
Mujeres						
Mariguana	0.7	1.4	1.6	1.217-2.051	3.7*	3.276-4.091
Cocaína	0.4	0.7	0.7	0.489-0.981	1.1	0.856-1.244
Crack	***	0.2	0.1	0.025-0.244	0.2	0.145-0.312
Alucinógenos	0.1	0.1	0.3	0.072-0.515	0.4	0.232-0.559
Inhalables	0.1	0.2	0.3	0.168-0.472	0.6	0.394-0.722
Heroína	***	***	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.2	0.4	0.124-0.697	0.4	0.243-0.562
Drogas Ilegales	1.0	1.9	2.3	1.760-2.747	4.3*	3.869-4.753
Cualquier Droga	2.1	2.6	3.0	2.459-3.513	4.8*	4.382-5.293

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.



**Cuadro 1B: Tendencias del consumo de drogas en el último año.
Población de 12 a 65 años**

	2002	2008		2011		2016
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	0.6	1.0	1.2	0.957-1.461	2.1*	1.911-2.362
Cocaína	0.3	0.4	0.5	0.351-0.643	0.8	0.632-0.971
Crack	***	0.1	0.1	0.033-0.193	0.2	0.112-0.240
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.010-0.146	0.2	0.086-0.233
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.049-0.194	0.2	0.178-0.318
Heroína	***	***	***	---	***	0.006-0.049
Metanfetaminas	***	0.1	0.2	0.068-0.233	0.2	0.178-0.309
Drogas Ilegales	0.8	1.4	1.5	1.229-1.782	2.7*	2.417-2.947
Cualquier droga	1.3	1.6	1.8	1.529-2.120	2.9*	2.670-3.216
Hombres						
Mariguana	1.2	1.7	2.2	1.717-2.657	3.5*	3.032-3.871
Cocaína	0.7	0.8	0.9	0.636-1.211	1.4	1.055-1.729
Crack	***	0.2	0.2	0.055-0.379	0.3	0.165-0.406
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.005-0.275	0.2	0.132-0.296
Inhalables	0.2	0.2	0.2	0.066-0.336	0.4	0.263-0.523
Heroína	***	0.1	***	---	0.1	0.008-0.098
Metanfetaminas	0.1	0.2	0.2	0.103-0.346	0.4	0.271-0.510
Drogas Ilegales	1.7	2.3	2.6	2.126-3.147	4.4*	3.897-4.906
Cualquier droga	2.2	2.5	3.0	2.435-3.516	4.6*	4.139-5.160
Mujeres						
Mariguana	0.1	0.4	0.3	0.084-0.502	0.9*	0.710-1.107
Cocaína	***	0.1	0.1	0.027-0.169	0.2	0.157-0.342
Crack	--	***	***	---	0.1	0.024-0.124
Alucinógenos	***	***	***	---	0.1	---
Inhalables	***	***	***	---	0.1	0.054-0.173
Heroína	--	***	--	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.1	0.1	---	0.1	0.044-0.169
Drogas Ilegales	0.1	0.5	0.4	0.200-0.692	1.1*	0.867-1.286
Cualquier droga	0.5	0.8	0.7	0.470-1.023	1.3*	1.113-1.585


Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.



b) Población de 12 a 17 años

En adolescentes, el consumo alguna vez aumentó entre 2011 y 2016 de 3.3% a 6.4% para cualquier droga, de 2.9% a 6.2% en drogas ilegales y de 2.4% a 5.3% en marihuana. Cocaína se mantiene estable.

También se observa que en los hombres las prevalencias de alguna vez tienen cambios significativos (de 3.9% a 6.6% en drogas ilegales, de 4% a 6.6% en cualquier droga y de 3.5% a 5.8% para marihuana).

En las mujeres aumentó de 2.6% a 6.1% el consumo de cualquier droga alguna vez, de 1.9% a 5.8% el de drogas ilegales y de 1.3% a 4.8% el de marihuana (Cuadro 2).

El consumo en el último año en la población total aumentó casi el doble: cualquier droga de 1.6% en 2011 a 3.1% en 2016, de drogas ilegales, de 1.5% a 2.9% y de marihuana de 1.3% a 2.6%. Sólo en el caso de las mujeres se presentaron incrementos en la prevalencia del último año: cualquier droga de 1.1% a 2.7%, drogas ilegales de 0.9% a 2.3% y marihuana de 0.6% a 2.1% (Cuadro 2).



**Cuadro 2: Tendencias del consumo de drogas.
Población de 12 a 17 años**

Alguna Vez	2002	2008	%	2011	%	2016
	%	%		IC 95%		IC 95%
Total						
Mariguana	1.1	2.0	2.4	1.719-3.082	5.3*	4.562-6.068
Cocaína	0.2	0.8	0.7	0.396-1.066	1.1	0.805-1.345
Drogas ilegales	1.3	2.6	2.9	2.208-3.672	6.2*	5.211-7.191
Cualquier droga	1.6	2.9	3.3	2.546-4.110	6.4*	5.365-7.352
Hombres						
Mariguana	2.1	2.9	3.5	2.272-4.665	5.8*	4.965-6.681
Cocaína	0.4	1.2	0.8	0.305-1.212	1.0	0.733-1.284
Drogas ilegales	2.3	3.5	3.9	2.688-5.161	6.6*	5.507-7.633
Cualquier droga	2.4	3.7	4.0	2.796-5.286	6.6*	5.567-7.697
Mujeres						
Mariguana	0.2	1.2	1.3	0.658-1.950	4.8*	3.659-5.931
Cocaína	0.1	0.4	0.7	0.223-1.181	1.1	0.676-1.610
Drogas ilegales	0.3	1.6	1.9	1.130-2.728	5.8*	4.380-7.266
Cualquier droga	0.7	2.1	2.6	1.604-3.586	6.1*	4.632-7.527
Último Año						
	2002	2008		2011		2016
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	0.5	1.2	1.3	0.816-1.835	2.6*	2.194-3.011
Cocaína	0.2	0.4	0.4	0.160-0.641	0.6	0.381-0.800
Drogas ilegales	0.7	1.5	1.5	1.001-2.081	2.9*	2.469-3.308
Cualquier droga	0.8	1.7	1.6	1.093-2.188	3.1*	2.619-3.483
Hombres						
Mariguana	0.9	1.7	2.0	1.111-2.927	3.1	2.492-3.696
Cocaína	0.3	0.6	0.4	0.097-0.667	0.6	0.396-0.840
Drogas ilegales	1.3	2.1	2.2	1.233-3.072	3.4	2.810-4.046
Cualquier droga	1.4	2.1	2.2	1.233-3.072	3.4	2.822-4.058
Mujeres						
Mariguana	0.1	0.6	0.6	0.176-1.050	2.1*	1.526-2.674
Cocaína	0.1	0.2	0.4	0.053-0.787	0.6	0.202-0.922
Drogas ilegales	0.2	0.9	0.9	0.376-1.451	2.3*	1.750-2.923
Cualquier droga	0.3	1.3	1.1	0.545-1.683	2.7*	2.030-3.278

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

c) Población de 18 a 34 años

En este grupo de edad, incrementaron las prevalencias alguna vez con respecto a 2011 en cualquier droga (11.3% a 15%), drogas ilegales (10.6% a 14.5%) y mariguana (8.7% a 12.8%). En los hombres aumentó de 18.5% a 22.8% para cualquier droga, de 17.8% a 22.6% en drogas ilegales y de 15% a 20% en mariguana.

En el caso de las mujeres, se tiene el mismo patrón de aumento (de 4.6% a 7.6% cualquier droga, de 3.9% a 7% drogas ilegales y de 2.8% a 6.1% mariguana) (Cuadro 3A).

**Cuadro 3A: Tendencias del consumo de drogas alguna vez.
Población de 18 a 34 años**

	2002	2008		2011		2016
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	4.6	5.5	8.7	7.541-9.906	12.8*	11.891-13.684
Cocaína	2.4	3.6	5.2	4.278-6.085	5.2	4.542-5.801
Crack	0.2	1.0	1.9	1.197-2.521	1.4	1.086-1.645
Alucinógenos	0.4	0.5	1.3	0.718-1.894	1.2	0.828-1.480
Inhalables	0.8	1.0	1.3	0.736-1.885	1.6	1.248-1.977
Heroína	0.2	0.2	0.3	---	0.3	0.131-0.434
Metanfetaminas	0.1	0.8	1.5	0.876-2.141	1.5	1.219-1.826
Cualquier droga ilegal	5.7	7.1	10.6	9.364-11.898	14.5*	13.541-15.493
Cualquier droga	6.5	7.5	11.3	10.018-12.582	15.0*	14.007-15.964
Hombres						
Mariguana	9.3	9.5	15.0	12.858-17.152	20.0*	18.381-21.597
Cocaína	4.4	6.3	9.4	7.638-11.221	8.9	7.697-10.083
Crack	0.5	1.7	3.5	2.186-4.874	2.4	1.877-2.974
Alucinógenos	0.7	0.8	2.0	0.923-3.085	1.6	1.048-2.127
Inhalables	1.7	1.8	2.3	1.136-3.449	2.6	1.918-3.253
Heroína	0.4	0.4	0.6	---	0.6	0.256-0.880
Metanfetaminas	0.2	1.3	2.3	1.162-3.405	2.5	2.004-3.009
Cualquier droga ilegal	11.0	11.8	17.8	15.474-20.121	22.6*	20.824-24.299
Cualquier droga	11.5	12.1	18.5	16.112-20.794	22.8*	21.102-24.581
Mujeres						
Mariguana	1.1	1.9	2.8	1.895-3.802	6.1*	5.182-6.934
Cocaína	0.9	1.2	1.2	0.693-1.726	1.7	1.283-2.112
Crack	***	0.4	0.3	0.028-0.563	0.4	0.203-0.549
Alucinógenos	0.1	0.2	0.7	0.106-1.200	0.7	0.367-1.131
Inhalables	0.1	0.2	0.4	0.117-0.666	0.7	0.397-1.010
Heroína	0.1	***	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.3	0.8	0.120-1.448	0.6	0.318-0.889
Cualquier droga ilegal	1.7	2.8	3.9	2.790-5.068	7.0*	6.082-7.915
Cualquier droga	2.8	3.3	4.6	3.428-5.794	7.6*	6.696-8.591

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.
Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Para los porcentajes de último año, nuevamente se presentan incrementos significativos: cualquier droga pasó de 2.8% a 5%, el consumo de drogas ilegales se duplicó (de 2.3% a 4.6%) y mariguana de 1.9% a 3.5% (Cuadro 3B).

En hombres, cualquier droga incrementó de 4.7% a 8.2%, drogas ilegales de 4.1% a 7.8% y mariguana de 3.4% a 5.9%. En el caso de mujeres únicamente fue significativo el aumento en drogas ilegales (de 0.6% a 1.6%) (Cuadro 3B).



**Cuadro 3B: Tendencias del consumo de drogas en el último año.
Población de 18 a 34 años**

	2002	2008		2011		2016
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	1.0	1.4	1.9	1.295-2.423	3.5*	3.027-4.033
Cocaína	0.6	0.7	0.8	0.476-1.106	1.5	1.065-1.862
Crack	***	0.2	0.2	0.041-0.423	0.3	0.135-0.413
Alucinógenos	***	0.1	0.2	---	0.3	0.130-0.482
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.018-0.270	0.3	0.182-0.486
Heroína	***	***	***	---	***	---
Metanfetaminas	0.1	0.2	0.2	0.064-0.313	0.4	0.285-0.586
Drogas ilegales	1.4	2.0	2.3	1.681-2.907	4.6*	3.992-5.205
Cualquier droga	1.9	2.2	2.8	2.164-3.479	5.0*	4.347-5.582
Hombres						
Mariguana	2.2	2.4	3.4	2.344-4.411	5.9*	4.973-6.847
Cocaína	1.3	1.3	1.6	0.949-2.241	2.6	1.836-3.434
Crack	0.1	0.4	0.4	0.051-0.825	0.5	0.205-0.765
Alucinógenos	***	0.1	0.3	---	0.4	0.197-0.561
Inhalables	0.1	0.2	0.2	0.009-0.425	0.6	0.319-0.921
Heroína	0.1	0.1	***	---	0.1	---
Metanfetaminas	0.1	0.3	0.4	0.123-0.637	0.7	0.453-1.023
Drogas ilegales	3.0	3.3	4.1	3.011-5.279	7.8*	6.644-8.957
Cualquier droga	3.6	3.4	4.7	3.472-5.865	8.2*	7.022-9.352
Mujeres						
Mariguana	0.2	0.5	0.4	---	1.3	0.874-1.738
Cocaína	***	0.2	***	---	0.4	0.190-0.547
Crack	--	0.1	***	---	0.1	0.015-0.139
Alucinógenos	***	***	--	---	0.2	---
Inhalables	--	***	0.1	---	0.1	---
Heroína	--	--	--	---	***	---
Metanfetaminas	--	0.1	***	---	0.2	0.034-0.274
Drogas ilegales	0.2	0.8	0.6	0.045-1.081	1.6*	1.146-2.066
Cualquier droga	0.7	1.0	1.1	0.497-1.690	2.0	1.443-2.464

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

d) Población de 35 a 65 años

En general se mantuvo estable el consumo de sustancias para alguna vez en este grupo de edad; únicamente la prevalencia de mariguana se incrementó significativamente de 4.8% a 6.1%. Es importante mencionar que aunque no se encontraron aumentos estadísticamente significativos en el consumo con respecto a 2011, sí hay diferencias importantes entre el consumo de hombres y mujeres (Cuadro 4A).

**Cuadro 4A: Tendencias del consumo de drogas alguna vez.
Población de 35 a 65 años**

	2002	2008	2011	2016		
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	3.5	3.8	4.8	4.141-5.509	6.1*	5.534-6.722
Cocaína	0.6	1.8	2.5	1.983-2.945	3.0	2.622-3.294
Crack	***	0.3	0.6	0.372-0.811	0.6	0.456-0.722
Alucinógenos	0.2	0.3	0.4	0.184-0.546	0.4	0.270-0.509
Inhalables	0.2	0.5	0.5	0.314-0.765	0.6	0.408-0.736
Heroína	***	0.1	0.2	0.082-0.360	0.1	0.021-0.216
Metanfetaminas	***	0.3	0.4	0.181-0.600	0.4	0.278-0.477
Cualquier droga ilegal	4.0	4.5	5.7	4.988-6.496	7.0	6.426-7.648
Cualquier droga	5.3	5.2	6.4	5.614-7.179	7.5	6.891-8.132
Hombres						
Mariguana	7.1	6.9	9.4	8.045-10.820	11.7	10.494-12.870
Cocaína	1.3	3.3	4.8	3.864-5.806	5.8	5.085-6.446
Crack	***	0.6	1.2	0.768-1.682	1.2	0.916-1.475
Alucinógenos	0.5	0.5	0.8	0.370-1.131	0.7	0.463-0.907
Inhalables	0.5	1.0	1.1	0.604-1.497	1.1	0.769-1.429
Heroína	***	0.2	0.5	0.174-0.758	0.3	0.044-0.457
Metanfetaminas	0.1	0.5	0.7	0.321-1.037	0.7	0.518-0.898
Cualquier droga ilegal	8.2	8.2	11.1	9.617-12.666	13.4	12.160-14.601
Cualquier droga	9.2	8.6	11.6	10.080-13.183	13.8	12.581-15.034
Mujeres						
Mariguana	0.5	1.0	0.7	0.322-0.989	1.1	0.869-1.385
Cocaína	0.1	0.4	0.3	0.109-0.527	0.4	0.277-0.583
Crack	--	***	***	---	***	0.016-0.070
Alucinógenos	***	0.1	***	---	0.1	0.015-0.232
Inhalables	***	0.1	0.1	---	0.1	0.003-0.193
Heroína	--	***	--	---	--	---
Metanfetaminas	--	0.1	0.1	---	0.1	0.023-0.138
Cualquier droga ilegal	0.6	1.2	0.9	0.469-1.242	1.3	1.055-1.596
Cualquier droga	2.0	2.1	1.7	1.148-2.171	1.8	1.517-2.169

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Respecto a las prevalencias en el último año no se encontraron incrementos significativos en esta población. La prevalencia de consumo total fue del 1%, con 1.8% para los hombres y 0.3% para las mujeres (Cuadro 4B).

**Cuadro 4B: Tendencias del consumo de drogas en el último año.
Población de 35 a 65 años**

	2002	2008	2011	2016		
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	0.2	0.6	0.6	0.352-0.779	0.7	0.510-0.831
Cocaína	0.2	0.2	0.3	0.132-0.398	0.3	0.168-0.378
Crack	--	***	0.1	---	0.1	0.011-0.090
Alucinógenos	***	***	***	---	***	---
Inhalables	0.1	0.1	***	---	***	0.013-0.073
Heroína	--	0.1	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	***	0.1	---	0.1	0.034-0.101
Drogas ilegales	0.3	0.8	0.8	0.507-1.025	0.8	0.666-1.004
Cualquier droga	0.9	1.0	1.0	0.693-1.267	1.0	0.847-1.225
Hombres						
Mariguana	0.5	1.1	1.1	0.702-1.583	1.3	0.966-1.612
Cocaína	0.4	0.4	0.5	0.249-0.793	0.5	0.326-0.765
Crack	--	0.1	0.1	---	0.1	0.019-0.184
Alucinógenos	***	0.1	***	---	***	---
Inhalables	0.2	0.1	***	---	0.1	0.028-0.154
Heroína	--	0.1	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.1	0.1	---	0.1	0.072-0.213
Drogas ilegales	0.7	1.4	1.4	0.953-1.900	1.6	1.268-1.952
Cualquier droga	1.4	1.7	1.7	1.206-2.262	1.8	1.461-2.189
Mujeres						
Mariguana	***	0.1	***	---	0.1	0.021-0.207
Cocaína	***	***	***	---	***	0.003-0.052
Crack	--	***	--	---	***	---
Alucinógenos	--	***	--	---	--	---
Inhalables	--	0.1	--	---	--	---
Heroína	--	--	--	---	--	---
Metanfetaminas	--	***	0.1	---	--	---
Drogas ilegales	***	0.1	0.2	---	0.1	0.041-0.233
Cualquier droga	0.5	0.4	0.3	0.029-0.566	0.3	0.187-0.465

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.


Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Tendencias en la edad de inicio del consumo de drogas

Con respecto a la edad de inicio del consumo de drogas (Gráfica 2), se observan disminuciones a lo largo de los años (20.6 años en 2002, 18.7 en 2008, 18.8 en 2011 y 17.8 años en 2016). Por sexo también se observa este patrón, en los hombres pasó de 19.8 años en 2002 a 17.7 años en 2016 y en las mujeres de 23.6 años a 18.2 años. Adicionalmente se observa que la edad de inicio de los y las consumidores (as) es prácticamente la misma.



Tendencias regionales del consumo de drogas (Encuestas 2011-2016)

a) Población Total

Debido a que la ENA 2011 sólo tiene una representación regional y nacional, las tendencias que en esta sección se presentan son regionales. De manera que el consumo de cualquier droga alguna vez aumentó significativamente con respecto a 2011 en la población total en las regiones Occidental (de 10.3% a 14.4%), Norcentral (de 8.4 a 11.5%), Sur (de 5.3% a 9.6%) y Centro (de 6.6% a 9.4%).

El consumo de drogas ilegales se incrementó al pasar de 9.2% a 13.7% en la región Occidental, de 7.3% a 10.9% en la región Norcentral, de 5% a 9.3% en la región Sur y de 6.2% a 9.1% en el Centro.

En el caso de los hombres, sólo se observa aumento significativo en la región Sur, tanto para cualquier droga (de 9.3% a 15.7%), como para drogas ilegales (de 9.1% a 15.6%), mientras que en las mujeres el consumo de cualquier droga incrementó significativamente en las regiones Occidental (de 3.8% a 8%), Noroccidental (de 1.9% a 4.4%), Centro Sur (de 1.9% a 3.9%) y Sur (de 1.5% a 3.9%), y el consumo de drogas ilegales presentó aumento en las regiones Norcentral (1.9% a 4.8%), Noroccidental (1.5% a 4.1%), Occidental (2.4% a 7.2%), Centro Sur (1.3% a 3.2%) y Sur (1% a 3.4%) (Cuadro 5A).

Por su parte, el consumo de cualquier droga en el último año en la población total ha aumentado de 2% a 4.5% en la región Occidental, de 2% a 3.8% en la región Norcentral, y de 0.8% a 2.2% en el Sur, mientras que el consumo de drogas ilegales en el último año aumentó significativamente de 1.5% a 4.1% en el Occidente, de 1.6% a 3.3% en la región Norcentral, de 1.2% a 2.4% en el Centro y de 0.6% a 2% en el Sur.



El consumo de cualquier droga en el último año aumentó significativamente en los hombres de las regiones Occidental (de 3.2% a 6.8%) y Sur (de 1% a 3.5%), y el consumo de drogas ilegales en el último año incrementó en las regiones Occidental (de 2.7% a 6.6%), Centro (de 1.7% a 4%) y Sur (de 0.9% a 3.4%). En las mujeres no hubo cambios significativos en las prevalencias de cualquier droga o drogas ilegales en las regiones, pero sí en el porcentaje nacional con respecto a 2011, tanto en cualquier droga (de 0.7% a 1.3%) como en drogas ilegales (de 0.4% a 1.1%) (Cuadro 5B).

**Cuadro 5A: Tendencias regionales del consumo de drogas alguna vez.
Población de 12 a 65 años**

	2011				2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%						
Total								
Norcentral	8.4	6.970-9.875	7.3	5.933-8.748	11.5*	10.293-12.750	10.9*	9.698-12.139
Noroccidental	9.2	7.810-10.683	9.0	7.529-10.423	11.5	10.400-12.503	11.2	10.121-12.208
Nororiental	9.6	8.036-11.071	8.9	7.412-10.413	10.2	8.926-11.464	9.7	8.458-10.935
Occidental	10.3	8.240-12.326	9.2	7.233-11.231	14.4*	12.328-16.437	13.7*	11.655-15.752
Centro	6.6	5.092-8.186	6.2	4.697-7.709	9.4*	8.302-10.501	9.1*	7.981-10.194
Ciudad de México	8.8	6.885-10.733	7.9	6.117-9.709	10.6	8.355-12.906	10.3	8.021-12.543
Centro Sur	7.5	6.027-8.985	6.8	5.345-8.348	8.5	7.556-9.533	8.1	7.101-9.008
Sur	5.3	3.798-6.829	5.0	3.501-6.454	9.6*	8.585-10.682	9.3*	8.296-10.353
Nacional	7.8	7.177-8.485	7.2	6.577-7.855	10.3*	9.788-10.813	9.9*	9.372-10.391
Hombres								
Norcentral	13.6	11.013-16.089	13.0	10.428-15.545	17.8	15.575-20.039	17.2	14.971-19.443
Noroccidental	16.5	13.757-19.204	16.3	13.606-19.080	18.5	16.644-20.276	18.2	16.388-19.985
Nororiental	15.5	12.533-18.476	15.0	12.055-18.003	15.5	13.315-17.648	15.2	13.071-17.407
Occidental	17.2	13.713-20.607	16.5	13.038-19.954	21.2	17.675-24.686	20.6	17.077-24.087
Centro	10.6	7.722-13.454	10.1	7.216-12.948	14.7	12.687-16.731	14.4	12.410-16.455
Ciudad de México	12.6	9.471-15.735	11.9	8.851-15.009	17.5	13.499-21.543	17.3	13.315-21.298
Centro Sur	13.6	10.632-16.660	13.0	9.998-16.031	13.6	11.770-15.411	13.4	11.554-15.189
Sur	9.3	6.398-12.116	9.1	6.252-11.991	15.7*	13.874-17.538	15.6*	13.720-17.383
Nacional	13.0	11.792-14.216	12.5	11.302-13.726	16.2*	15.240-17.062	15.8*	14.938-16.757
Mujeres								
Norcentral	3.5	2.296-4.701	1.9	0.943-2.894	5.4	4.270-6.620	4.8*	3.747-5.934
Noroccidental	1.9	1.038-2.837	1.5	0.752-2.314	4.4*	3.500-5.335	4.1*	3.216-5.017
Nororiental	3.8	2.118-5.419	3.0	1.372-4.562	5.1	3.914-6.321	4.4	3.283-5.464
Occidental	3.8	2.108-5.470	2.4	0.965-3.779	8.0*	5.710-10.229	7.2*	4.958-9.472
Centro	3.0	1.666-4.375	2.6	1.331-3.969	4.6	3.659-5.488	4.2	3.329-5.120
Ciudad de México	5.4	3.285-7.434	4.3	2.420-6.103	4.3	2.678-5.972	3.9	2.251-5.460
Centro Sur	1.9	1.108-2.763	1.3	0.559-1.943	3.9*	3.116-4.773	3.2*	2.495-3.920
Sur	1.5	0.608-2.470	1.0	0.182-1.841	3.9*	3.069-4.719	3.4*	2.644-4.234
Nacional	3.0	2.438-3.535	2.3	1.740-2.767	4.8*	4.382-5.293	4.3*	3.869-4.753

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.



**Cuadro 5B: Tendencias regionales del consumo de drogas en el último año.
Población de 12 a 65 años**

	2011				2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%						
Total								
Norcentral	2.0	1.321-2.773	1.6	0.926-2.320	3.8*	3.042-4.461	3.3*	2.629-4.013
Noroccidental	2.9	2.055-3.773	2.8	1.945-3.660	3.6	2.984-4.259	3.5	2.846-4.108
Nororiental	3.1	1.966-4.275	2.4	1.348-3.474	2.7	2.011-3.345	2.4	1.722-2.989
Occidental	2.0	1.365-2.627	1.5	0.921-2.014	4.5*	3.111-5.827	4.1*	2.807-5.491
Centro	1.5	0.837-2.131	1.2	0.591-1.784	2.6	2.047-3.080	2.4*	1.913-2.920
Ciudad de México	2.1	1.186-2.976	1.7	0.874-2.575	2.9	1.710-4.107	2.7	1.561-3.929
Centro Sur	1.5	0.717-2.200	1.3	0.604-2.069	2.6	2.072-3.132	2.1	1.669-2.608
Sur	0.8	0.311-1.194	0.6	0.145-0.963	2.2*	1.736-2.631	2.0*	1.536-2.412
Nacional	1.8	1.529-2.120	1.5	1.229-1.782	2.9*	2.670-3.216	2.7*	2.417-2.947
Hombres								
Norcentral	3.2	1.765-4.610	3.0	1.588-4.340	5.7	4.431-6.946	5.3	4.043-6.516
Noroccidental	5.3	3.557-7.034	5.3	3.557-7.034	6.2	4.978-7.334	6.0	4.812-7.135
Nororiental	5.3	3.132-7.520	4.5	2.424-6.630	3.7	2.502-4.884	3.4	2.267-4.607
Occidental	3.2	2.018-4.316	2.7	1.619-3.811	6.8*	4.340-9.315	6.6*	4.095-9.058
Centro	2.1	1.000-3.223	1.7	0.684-2.670	4.1	3.111-5.119	4.0*	3.015-5.016
Ciudad de México	3.3	1.694-4.923	2.6	1.141-4.115	4.9	2.623-7.208	4.7	2.448-6.997
Centro Sur	2.7	1.270-4.228	2.7	1.270-4.228	4.1	3.106-5.054	3.5	2.593-4.413
Sur	1.0	0.224-1.767	0.9	0.102-1.603	3.5*	2.703-4.360	3.4*	2.569-4.218
Nacional	3.0	2.435-3.516	2.6	2.126-3.147	4.6*	4.139-5.160	4.4*	3.897-4.906
Mujeres								
Norcentral	1.0	0.403-1.501	0.3	---	1.9	1.152-2.607	1.4	0.770-2.086
Noroccidental	0.5	0.031-0.984	0.3	---	1.1	0.646-1.509	1.0	0.548-1.393
Nororiental	1.0	0.119-1.835	0.4	---	1.7	1.007-2.400	1.3	0.713-1.919
Occidental	0.9	0.238-1.541	0.3	---	2.2	0.962-3.525	1.9	0.619-3.098
Centro	0.9	0.170-1.650	0.7	0.031-1.448	1.2	0.726-1.577	1.0	0.619-1.303
Ciudad de México	1.0	0.030-1.902	0.9	---	1.1	0.289-1.856	0.9	0.194-1.676
Centro Sur	0.3	---	0.1	---	1.3	0.761-1.749	0.9	0.497-1.292
Sur	0.5	0.064-0.976	0.3	---	0.9	0.530-1.289	0.6	0.290-0.974
Nacional	0.7	0.470-1.023	0.4	0.200-0.692	1.3*	1.113-1.585	1.1*	0.867-1.286

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Así también, el consumo alguna vez de marihuana mostró incrementos significativos con respecto a 2011 en las regiones Occidental (de 6.8% a 11.3%), Noroccidental (de 7.4% a 10.2%), Norcentral (de 5.9% a 9.4%), Sur (de 4.6% a 8.3%) y Centro (5.2% a 8.1%) en la población total.

En hombres, sólo se presentó un incremento significativo en la región Sur, al pasar de 8.4% a 14%, mientras que en las mujeres se registraron incrementos de 1.9% a 6.3% en la región Occidental, de 1.1% a 4.2% en la región Norcentral, de 1% a 3.6% en la Noroccidental, de 1% a 2.8% en la región Sur y de 1% a 2.6% en la Centro Sur.

El consumo de cocaína no mostró diferencias significativas con respecto a 2011; sin embargo, es importante resaltar que la región Norcentral (4.8%) tuvo una prevalencia mayor a la nacional (3.5%) en la población total (Cuadro 6A).

**Cuadro 6A: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína alguna vez.
Población de 12 a 65 años**

	2011				2016			
	Marihuana		Cocaína		Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total								
Norcentral	5.9	4.807-7.022	3.8	2.825-4.843	9.4*	8.209-10.499	4.8	3.895-5.740
Noroccidental	7.4	6.040-8.778	4.9	3.671-6.142	10.2*	9.206-11.204	4.5	3.754-5.197
Nororiental	7.4	5.793-9.050	4.7	3.481-5.884	8.5	7.310-9.641	3.1	2.427-3.773
Occidental	6.8	5.461-8.203	4.0	2.859-5.110	11.3*	9.627-13.005	5.9	4.408-7.414
Centro	5.2	3.766-6.655	2.4	1.398-3.318	8.1*	7.097-9.130	2.6	2.062-3.145
Ciudad de México	6.7	5.118-8.374	2.6	1.716-3.507	9.1	6.983-11.302	3.0	1.916-4.166
Centro Sur	5.7	4.120-7.210	3.5	2.334-4.568	6.9	6.014-7.849	3.2	2.653-3.779
Sur	4.6	3.244-6.032	2.2	1.287-3.207	8.3*	7.295-9.228	3.4	2.835-4.003
Nacional	6.0	5.367-6.570	3.3	2.828-3.680	8.6*	8.184-9.114	3.5	3.231-3.819
Hombres								
Norcentral	10.9	8.717-13.037	6.5	4.613-8.468	14.7	12.598-16.835	8.0	6.281-9.772
Noroccidental	13.8	11.099-16.490	9.2	6.788-11.656	16.7	14.998-18.478	7.7	6.344-8.964
Nororiental	12.9	9.463-16.258	8.3	5.954-10.615	13.4	11.330-15.385	5.2	3.946-6.363
Occidental	12.1	9.765-14.358	7.5	5.366-9.658	16.6	13.973-19.294	10.3	7.492-13.042
Centro	8.9	6.305-11.437	4.2	2.338-6.155	13.1	11.188-14.971	4.7	3.637-5.746
Ciudad de México	10.8	7.988-13.686	4.0	2.423-5.553	15.4	11.552-19.348	5.6	3.501-7.685
Centro Sur	10.8	7.860-13.816	6.6	4.435-8.812	11.7	9.861-13.487	5.7	4.613-6.760
Sur	8.4	5.742-11.111	4.3	2.395-6.214	14.0*	12.241-15.801	5.9	4.825-7.061
Nacional	10.6	9.499-11.692	5.9	5.111-6.774	14.0*	13.130-14.804	6.2	5.624-6.727
Mujeres								
Norcentral	1.1	0.533-1.765	1.2	0.361-2.109	4.2*	3.128-5.213	1.7	1.008-2.424
Noroccidental	1.0	0.327-1.590	0.5	0.100-0.995	3.6*	2.794-4.501	1.3	0.834-1.736
Nororiental	2.1	0.849-3.420	1.2	0.136-2.227	3.8	2.727-4.846	1.1	0.523-1.731
Occidental	1.9	0.641-3.146	0.7	0.167-1.139	6.3*	4.093-8.507	1.8	0.700-2.904
Centro	1.9	0.809-2.906	0.6	0.081-1.175	3.6	2.813-4.377	0.7	0.440-0.966
Ciudad de México	3.0	1.459-4.595	1.4	0.349-2.372	3.4	1.830-4.913	0.7	0.088-1.324
Centro Sur	1.0	0.383-1.560	0.6	0.103-1.043	2.6*	1.977-3.241	1.0	0.481-1.448
Sur	1.0	0.275-1.748	0.3	---	2.8*	2.154-3.482	1.0	0.665-1.402
Nacional	1.6	1.217-2.051	0.7	0.489-0.981	3.7*	3.276-4.091	1.1	0.856-1.244

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Para el consumo en el último año, se observaron incrementos significativos en la población total en las regiones Norcentral, de 1% a 2.8%, Occidental, de 1.3% a 2.7% y Sur de 0.5% a 1.5%.

En hombres, este aumento se presentó en las regiones Norcentral (de 1.7% a 4.6%) y Sur (de 0.8% a 2.5%). En las mujeres no hubo incrementos con respecto a 2011, sin embargo en la región Noroccidental el porcentaje de consumo superó el promedio nacional (3.1% y 2.1% respectivamente). En cuanto al consumo de cocaína en el último año, presenta un comportamiento estable en comparación con 2011 (Cuadro 6B).



**Cuadro 6B: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína en el último año.
Población de 12 a 65 años**

	2011				2016			
	Marihuana		Cocaína		Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total								
Norcentral	1.0	0.495-1.532	0.8	0.207-1.330	2.8*	2.133-3.447	1.0	0.549-1.374
Noroccidental	2.3	1.548-3.005	1.0	0.363-1.686	3.1	2.476-3.642	0.7	0.408-1.021
Nororiental	1.9	1.031-2.839	1.1	0.452-1.751	1.9	1.309-2.395	0.6	0.254-0.982
Occidental	1.3	0.784-1.812	0.5	0.154-0.810	2.7*	1.865-3.621	1.4	0.331-2.531
Centro	1.0	0.450-1.594	0.2	---	2.0	1.507-2.433	0.7	0.459-1.023
Ciudad de México	1.5	0.700-2.380	0.1	---	2.5	1.365-3.692	0.6	---
Centro Sur	0.9	0.228-1.481	0.8	0.262-1.329	1.7	1.233-2.095	0.7	0.449-1.006
Sur	0.5	0.138-0.918	0.2	---	1.5*	1.112-1.894	0.7	0.489-0.979
Nacional	1.2	0.957-1.461	0.5	0.351-0.643	2.1*	1.911-2.362	0.8	0.632-0.971
Hombres								
Norcentral	1.7	0.753-2.744	1.3	0.257-2.429	4.6*	3.381-5.734	1.3	0.688-2.005
Noroccidental	4.3	2.817-5.775	2.0	0.722-3.356	5.3	4.204-6.329	1.2	0.622-1.790
Nororiental	3.8	1.999-5.619	2.2	0.895-3.574	2.9	1.838-3.943	0.7	0.160-1.288
Occidental	2.5	1.471-3.576	0.7	0.144-1.227	3.7	2.415-5.053	2.9	0.678-5.166
Centro	1.7	0.659-2.643	0.2	---	3.2	2.298-4.113	1.3	0.745-1.883
Ciudad de México	2.4	0.911-3.841	0.2	---	4.3	2.055-6.556	1.3	---
Centro Sur	1.8	0.488-3.105	1.6	0.543-2.681	2.8	1.911-3.599	1.2	0.686-1.654
Sur	0.8	0.053-1.545	0.2	---	2.5*	1.809-3.248	1.3	0.826-1.799
Nacional	2.2	1.717-2.657	0.9	0.636-1.211	3.5*	3.032-3.871	1.4	1.055-1.729
Mujeres								
Norcentral	0.3	---	0.2	---	1.1	0.471-1.691	0.6	0.060-1.118
Noroccidental	0.2	---	--	---	0.8	0.456-1.230	0.2	0.033-0.409
Nororiental	0.1	---	--	---	0.9	0.472-1.237	0.5	0.083-0.950
Occidental	0.1	---	0.3	---	1.8	0.570-3.047	***	---
Centro	0.4	---	0.1	---	0.8	0.512-1.182	0.2	0.058-0.382
Ciudad de México	0.8	---	0.1	---	0.9	0.163-1.641	--	---
Centro Sur	--	---	0.1	---	0.7	0.345-0.993	0.3	0.014-0.635
Sur	0.3	---	0.1	---	0.5	0.201-0.866	0.2	0.073-0.304
Nacional	0.3	0.084-0.502	0.1	0.027-0.169	0.9*	0.710-1.107	0.2	0.157-0.342

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***Porcentaje menor a 0.1

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

b) Población de 12 a 17 años

En la población adolescente, el consumo de cualquier droga alguna vez se ha duplicado con respecto a 2011 en las regiones Norcentral (de 3% a 6.2%) y Centro Sur (de 2.4% a 5.3%), mientras que en la región Centro aumentó casi 3 veces (de 2.8% a 7.8%). En tanto, el consumo en el último año aumentó de manera significativa en las regiones Centro y Centro Sur, al pasar de 1.1% a 3.1% y de 0.5% a 3.1% respectivamente. Por su parte, el consumo alguna vez de drogas ilegales incrementó más del doble en las regiones Norcentral y Centro Sur (2.6% a 6.2% y de 2.2% a 5.2% respectivamente) y tres veces más en la región Centro (de 2.2% a 7.6%), mientras que el consumo en el último año aumenta en la región Norcentral, al pasar de 1.2% a 3.7% (Cuadro 7).



**Cuadro 7: Tendencias regionales del consumo de drogas.
Población de 12 a 17 años**

Alguna Vez Región	2011				2016			
	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%
Norcentral	3.0	1.477-4.448	2.6	1.172-3.980	6.2*	4.566-7.873	6.2*	4.531-7.818
Noroccidental	4.2	1.804-6.539	4.2	1.804-6.539	5.4	3.958-6.890	5.1	3.717-6.552
Nororiental	6.3	3.151-9.514	5.4	2.355-8.451	5.5	4.000-6.921	5.5	4.000-6.921
Occidental	3.6	1.892-5.388	3.3	1.640-4.987	7.5	5.065-10.017	7.3	4.918-9.740
Centro	2.8	1.132-4.521	2.2	0.726-3.712	7.8*	5.035-10.576	7.6*	4.783-10.327
Ciudad de México	4.9	0.443-9.394	4.9	0.443-9.394	7.2	3.963-10.473	7.2	3.963-10.473
Centro Sur	2.4	1.053-3.803	2.2	0.845-3.515	5.3*	3.857-6.723	5.2*	3.766-6.621
Sur	2.2	0.481-3.863	2.1	0.372-3.739	3.8	2.923-4.743	3.7	2.800-4.596
Nacional	3.3	2.546-4.110	2.9	2.208-3.672	6.4*	5.365-7.352	6.2*	5.211-7.191
Último Año Región	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%
Norcentral	1.5	0.353-2.599	1.2	0.145-2.267	3.7	2.403-4.997	3.7*	2.403-4.997
Noroccidental	2.3	0.536-4.082	2.3	0.536-4.082	3.2	2.160-4.236	3.1	2.081-4.152
Nororiental	4.5	1.623-7.462	4.0	1.202-6.839	3.2	2.053-4.319	3.2	2.053-4.319
Occidental	1.6	0.357-2.846	1.6	0.357-2.846	3.0	2.009-3.993	2.8	1.885-3.805
Centro	1.1	0.071-2.109	1.1	0.071-2.109	3.1*	2.160-4.046	2.9	2.011-3.862
Ciudad de México	2.6	---	2.6	---	3.5	1.278-5.626	3.5	1.278-5.626
Centro Sur	0.5	0.006-0.983	0.4	---	3.1*	1.938-4.264	2.8	1.688-3.853
Sur	1.9	0.231-3.547	1.8	0.123-3.421	2.0	1.368-2.595	1.7	1.169-2.245
Nacional	1.6	1.093-2.188	1.5	1.001-2.081	3.1*	2.619-3.483	2.9*	2.469-3.308

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**Cuadro 8: Tendencias regionales del consumo de marihuana.
Población de 12 a 17 años**

Alguna Vez Región	2011		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.9	0.745-3.141	5.6*	4.020-7.080
Noroccidental	4.2	1.804-6.539	5.0	3.549-6.369
Nororiental	5.1	2.097-8.126	5.0	3.538-6.406
Occidental	2.3	0.888-3.627	7.1*	4.663-9.471
Centro	2.0	0.521-3.448	6.0*	4.113-7.969
Ciudad de México	2.9	---	6.0	3.200-8.857
Centro Sur	1.3	0.284-2.286	4.4*	3.001-5.721
Sur	2.1	0.372-3.739	3.1	2.215-3.888
Nacional	2.4	1.719-3.082	5.3*	4.562-6.068
Último Año Región	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.8	0.023-1.550	3.2*	2.014-4.368
Noroccidental	2.3	0.536-4.082	3.0	1.988-4.037
Nororiental	3.2	0.784-5.714	2.7	1.605-3.745
Occidental	1.4	0.203-2.559	2.6	1.694-3.569
Centro	1.0	0.013-2.036	2.6	1.733-3.552
Ciudad de México	2.1	---	3.2	1.082-5.361
Centro Sur	0.2	---	2.6	1.528-3.630
Sur	1.6	0.126-3.130	1.4	0.881-1.873
Nacional	1.3	0.816-1.835	2.6*	2.194-3.011

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.



En cuanto al consumo de marihuana alguna vez, son las regiones Occidental (2.3% a 7.1%), Norcentral (1.9% a 5.6%) y Centro Sur (de 1.3% a 4.4%) en donde se encontraron aumentos significativos en relación a 2011, mientras que el consumo de esta sustancia en el último año sólo incrementó en la región Norcentral (de 0.8% a 3.2%) (Cuadro 8).

c) Población de 18 a 65 años

En la población de 18 a 34 años, el consumo de cualquier droga y de drogas ilegales alguna vez ha incrementado significativamente en las regiones Norcentral, Occidental y Sur (cualquier droga: de 12.2% a 17.1%, de 14.2% a 21.8% y de 6% a 13.5% respectivamente; drogas ilegales: de 10.6% a 16.3%, de 13.2% a 21.4% y de 5.8% a 13.2% respectivamente). En la población de 35 a 65 años de edad, el consumo de cualquier droga alguna vez no tuvo variaciones significativas con respecto a 2011; sin embargo, la región Noroccidental (9.9%) muestra una prevalencia de consumo mayor al promedio nacional (7.5%); esta misma situación se observa al considerar el consumo alguna vez de drogas ilegales, que a pesar de mantenerse estable en ambas mediciones, nuevamente en la región Noroccidental el porcentaje de consumo fue mayor al nacional (9.6% y 7% respectivamente) (Cuadro 9).

La prevalencia de consumo en el último año de cualquier droga en la población de 18 a 34 años de edad se triplicó en la región Occidental (pasó de 2.6% a 8.4%), y el consumo de drogas ilegales aumentó 4 veces (de 2% a 8%) en la misma región. En la población de 35 a 65 años, tanto el consumo de cualquier droga como de drogas ilegales en el último año, se mantuvieron estables en ambas mediciones; sin embargo, es importante señalar que en la región Noroccidental el consumo de drogas ilegales fue del doble del promedio nacional (1.6% y 0.8% respectivamente) (Cuadro 9).

En la población de 18 a 34 años, el consumo de marihuana alguna vez aumentó en las regiones Norcentral (de 8.2% a 14.2%), mientras que en la región Sur se duplicó (de 5.3% a 11.5%).

El consumo de cocaína alguna vez no tuvo cambios significativos con respecto a 2011, pero en la región Occidental supera al promedio nacional (9.6% y 5.2% respectivamente). En tanto, en la población de 35 a 65 años de edad, no se observaron cambios significativos en el consumo de ninguna de las dos sustancias; sin embargo, con relación a la prevalencia nacional (6.1% y 3% para marihuana y cocaína), la región Noroccidental (8.3% y 4.4% respectivamente) tuvo una prevalencia significativamente mayor (Cuadro 10A).



**Cuadro 9: Tendencias regionales del consumo de drogas alguna vez.
Población de 18 a 65 años**

Alguna Vez Región	2011				2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%						
18 a 34 años								
Norcentral	12.2	9.716-14.591	10.6	8.159-12.971	17.1*	14.660-19.461	16.3*	13.910-18.713
Noroccidental	11.5	8.965-14.012	11.1	8.520-13.637	15.6	13.519-17.587	15.3	13.284-17.334
Nororiental	13.1	9.660-16.628	12.7	9.256-16.071	15.1	12.663-17.480	14.4	12.013-16.866
Occidental	14.2	10.924-17.571	13.2	10.009-16.474	21.8*	17.654-25.939	21.4*	17.216-25.507
Centro	11.3	8.193-14.479	10.7	7.628-13.863	13.1	11.183-15.026	12.7	10.736-14.580
Ciudad de México	13.4	9.436-17.334	12.9	8.982-16.773	16.7	11.841-21.498	16.5	11.648-21.315
Centro Sur	10.1	7.004-13.133	9.2	6.219-12.262	13.0	10.916-15.005	12.3	10.305-14.217
Sur	6.0	3.877-8.176	5.8	3.668-7.975	13.5*	11.491-15.411	13.2*	11.227-15.133
Nacional	11.3	10.018-12.582	10.6	9.364-11.898	15.0*	14.007-15.964	14.5*	13.541-15.493
35-65 años								
Norcentral	7.2	5.173-9.241	6.3	4.354-8.259	8.5	7.158-9.914	7.8	6.559-9.140
Noroccidental	9.1	7.190-10.948	8.8	6.933-10.719	9.9	8.501-11.302	9.6	8.239-10.913
Nororiental	7.5	4.993-9.938	6.8	4.406-9.160	7.6	6.102-8.999	7.0	5.676-8.312
Occidental	9.2	6.744-11.582	7.8	5.476-10.081	10.0	7.723-12.299	8.9	6.683-11.140
Centro	3.8	2.312-5.222	3.5	2.126-4.966	6.5	5.036-8.044	6.3	4.822-7.829
Ciudad de México	6.3	4.376-8.260	4.9	3.208-6.587	6.8	4.714-8.860	6.2	4.191-8.256
Centro Sur	7.4	5.214-9.532	6.7	4.542-8.835	6.0	4.939-7.086	5.5	4.483-6.598
Sur	6.0	3.512-8.479	5.4	2.970-7.874	8.2	6.835-9.634	7.8	6.437-9.178
Nacional	6.4	5.614-7.179	5.7	4.988-6.496	7.5	6.891-8.132	7.0	6.426-7.648
Último Año								
Región								
18 a 34 años								
Norcentral	3.1	1.430-4.796	2.4	0.779-4.048	6.2	4.611-7.792	5.6	4.048-7.162
Noroccidental	4.0	2.314-5.697	3.7	2.064-5.391	5.9	4.509-7.269	5.7	4.297-7.018
Nororiental	4.6	2.105-7.021	3.2	0.959-5.495	4.8	3.229-6.369	4.2	2.684-5.639
Occidental	2.6	1.354-3.859	2.0	0.861-3.085	8.4*	5.218-11.547	8.0*	4.815-11.154
Centro	2.5	1.026-4.056	2.0	0.571-3.330	4.2	3.080-5.298	3.9	2.853-5.007
Ciudad de México	3.8	1.784-5.746	3.4	1.516-5.378	5.0	2.092-7.916	5.0	2.092-7.916
Centro Sur	2.7	0.955-4.350	2.4	0.735-4.060	4.1	2.968-5.277	3.4	2.365-4.515
Sur	0.6	---	0.5	---	3.6	2.627-4.474	3.4	2.489-4.321
Nacional	2.8	2.164-3.479	2.3	1.681-2.907	5.0*	4.347-5.582	4.6*	3.992-5.205
35-65 años								
Norcentral	1.3	0.652-1.989	1.1	0.449-1.715	1.5	0.999-2.081	1.1	0.634-1.554
Noroccidental	2.1	1.085-3.196	2.1	1.085-3.196	1.7	1.178-2.203	1.6	1.103-2.103
Nororiental	1.3	0.345-2.275	1.1	0.165-2.032	0.6	0.319-0.917	0.5	0.208-0.710
Occidental	1.6	0.768-2.375	0.9	0.359-1.505	1.3	0.656-1.958	1.0	0.525-1.467
Centro	0.7	0.063-1.240	0.5	---	0.8	0.384-1.239	0.8	0.353-1.205
Ciudad de México	0.7	0.033-1.300	0.2	---	1.1	0.402-1.856	0.8	0.223-1.367
Centro Sur	0.8	---	0.8	---	1.0	0.592-1.482	0.7	0.373-1.047
Sur	0.4	---	0.1	---	0.8	0.519-1.156	0.6	0.308-0.871
Nacional	1.0	0.693-1.267	0.8	0.507-1.025	1.0	0.847-1.225	0.8	0.666-1.004

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**Cuadro 10A: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína alguna vez
Población de 18 a 65 años**

Región	2011				2016			
	Marihuana		Cocaína		Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
18-34 años								
Norcentral	8.2	6.083-10.310	5.7	3.621-7.736	14.2*	11.956-16.359	7.1	5.290-8.859
Noroccidental	9.1	6.792-11.476	5.7	3.707-7.682	14.4*	12.412-16.409	6.1	4.661-7.480
Nororiental	10.6	7.166-13.945	6.9	4.454-9.352	12.6	10.283-14.847	4.6	3.205-6.094
Occidental	9.6	6.803-12.358	6.5	4.139-8.934	17.0*	13.499-20.508	9.6	6.247-12.893
Centro	8.9	5.974-11.878	4.7	2.434-6.930	11.4	9.652-13.201	4.0	2.761-5.220
Ciudad de México	11.2	7.636-14.848	5.0	2.822-7.194	15.7	10.984-20.493	3.4	1.395-5.392
Centro Sur	7.6	4.861-10.368	5.2	2.992-7.325	10.7	8.774-12.602	4.5	3.409-5.667
Sur	5.3	3.293-7.399	3.1	1.635-4.541	11.5*	9.724-13.229	4.9	3.770-5.963
Nacional	8.7	7.541-9.906	5.2	4.278-6.085	12.8*	11.891-13.684	5.2	4.542-5.801
35-65 años								
Norcentral	5.4	3.555-7.271	3.4	1.959-4.931	6.5	5.264-7.648	4.1	3.061-5.138
Noroccidental	7.0	5.367-8.689	6.0	4.151-7.836	8.3	7.029-9.512	4.4	3.485-5.276
Nororiental	5.4	3.394-7.445	3.3	1.489-5.187	6.1	4.849-7.336	2.6	1.910-3.224
Occidental	6.0	4.385-7.699	2.7	1.556-3.780	7.6	5.451-9.677	4.6	3.001-6.250
Centro	3.0	1.660-4.388	1.0	0.286-1.762	5.8	4.307-7.313	1.9	1.346-2.448
Ciudad de México	4.3	2.645-5.942	1.4	0.553-2.226	4.8	3.006-6.567	3.2	1.773-4.587
Centro Sur	5.8	3.764-7.809	3.1	1.604-4.544	4.7	3.699-5.688	2.8	1.999-3.595
Sur	5.1	2.821-7.319	2.0	0.411-3.602	7.2	5.879-8.580	2.9	2.000-3.740
Nacional	4.8	4.141-5.509	2.5	1.983-2.945	6.1*	5.534-6.722	3.0	2.622-3.294

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.
Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

El consumo de marihuana en el último año en la población de 18 a 34 años, aumentó significativamente en la región Occidental (de 1.6% a 5%), así como en la región Norcentral de 1.4% a 4.9%, mientras que el consumo de cocaína no tuvo cambios significativos en ninguna de las regiones; aunque el porcentaje nacional pasó de 0.8% a 1.5%. En la población de 35 a 65 años no hubo incremento con respecto a 2011 en ninguna de las dos sustancias; sin embargo el consumo de marihuana en la región Noroccidental (1.4%) fue significativamente mayor que la prevalencia a nivel nacional (0.7%) (Cuadro 10B).

**Cuadro10B: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína en el último año.
Población de 18 a 65 años**

Región	2011				2016			
	Marihuana		Cocaína		Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
18-34 años								
Norcentral	1.4	0.270-2.531	1.2	---	4.9*	3.370-6.407	1.6	0.671-2.610
Noroccidental	2.9	1.483-4.328	1.4	0.133-2.663	4.8	3.608-6.046	1.2	0.537-1.947
Nororiental	2.8	0.908-4.662	1.6	0.274-2.924	3.2	1.985-4.425	1.2	0.331-2.063
Occidental	1.6	0.600-2.694	0.8	0.071-1.460	5.0*	2.939-7.043	3.1	0.463-5.805
Centro	1.8	0.434-3.150	0.3	---	3.1	2.095-4.040	1.2	0.608-1.791
Ciudad de México	3.1	1.215-5.052	0.1	---	4.6	1.747-7.481	1.1	---
Centro Sur	1.5	0.089-2.878	1.6	0.325-2.873	2.5	1.497-3.416	1.3	0.651-1.889
Sur	0.5	---	--	---	2.6	1.761-3.374	1.4	0.810-1.898
Nacional	1.9	1.295-2.423	0.8	0.476-1.106	3.5*	3.027-4.033	1.5	1.065-1.862
35-65 años								
Norcentral	0.8	0.214-1.301	0.5	---	0.7	0.356-1.088	0.4	0.121-0.678
Noroccidental	1.7	0.692-2.690	1.1	0.223-1.900	1.4	0.965-1.931	0.3	0.083-0.542
Nororiental	0.7	---	0.7	---	0.4	0.129-0.591	0.2	0.017-0.322
Occidental	0.9	0.359-1.505	0.1	---	0.6	0.234-1.036	0.3	0.060-0.548
Centro	0.3	---	--	---	0.7	0.250-1.080	0.3	0.046-0.612
Ciudad de México	0.2	---	0.1	---	0.7	0.162-1.271	0.3	---
Centro Sur	0.6	---	0.3	---	0.6	0.260-0.875	0.2	---
Sur	0.1	---	--	---	0.4	0.198-0.682	0.2	0.042-0.375
Nacional	0.6	0.352-0.779	0.3	0.132-0.398	0.7	0.510-0.831	0.3	0.168-0.378

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Tendencias y variaciones estatales del consumo de drogas (Encuestas 2008-2016)

Al observar los datos a nivel estatal, encontramos que el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida incrementó de 5.7% en 2008 a 10.3% en 2016. Por estado, los que presentaron mayor crecimiento proporcional a 2008 son: Jalisco de 5.3% a 16%, Colima de 2.8% a 12.4% y Coahuila de 3.6% a 11.4% (Cuadro 11A). A nivel nacional, Jalisco (16%), Quintana Roo (15.5%), Baja California (13.8%) y Nayarit (13.2%) tienen porcentajes por encima del promedio nacional.

El cuadro 11B muestra que el consumo en el último año de cualquier droga aumentó de 1.6% a 2.9%; el crecimiento proporcional más alto con respecto a 2008 se presentó en los estados de Jalisco (de 1% a 5.2%), Colima (de 0.3% a 3.1%) y San Luis Potosí (de 0.4% a 2.2%).

En 2016, todos los estados mostraron porcentajes de consumo dentro del promedio nacional (2.9%) excepto Oaxaca (1.5%) y Chiapas (1.1%), cuyos porcentajes de consumo son menores al nacional.

**Cuadro 11A: Incidencia acumulada del uso de cualquier droga.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.3	3.942-6.715	11.8*	9.723-13.932
Baja California	9.6	7.008-12.183	13.8	11.803-15.754
Baja California Sur	8.0	6.217-9.689	11.1	9.099-13.201
Campeche	5.3	3.576-7.059	11.8*	9.328-14.337
Chiapas	2.2	1.040-3.312	5.8*	4.170-7.455
Chihuahua	8.2	6.137-10.167	12.2	10.149-14.174
Ciudad de México	8.5	7.008-9.938	10.6	8.355-12.906
Coahuila	3.6	2.380-4.848	11.4*	9.215-13.499
Colima	2.8	1.764-3.758	12.4*	10.185-14.700
Durango	8.2	6.366-10.093	10.5	8.583-12.396
Estado de México	4.8	3.491-6.078	10.0*	7.936-12.150
Guanajuato	6.9	5.562-8.276	10.0	8.091-11.836
Guerrero	5.2	3.487-6.829	7.8	5.930-9.586
Hidalgo	9.2	6.855-11.544	7.9	6.155-9.710
Jalisco	5.3	3.905-6.746	16.0*	12.831-19.255
Michoacán	5.6	3.794-7.328	9.2*	7.500-10.892
Morelos	4.6	3.298-5.840	7.5	5.556-9.518
Nayarit	7.6	5.324-9.848	13.2*	10.916-15.512
Nuevo León	4.4	3.032-5.782	11.4*	9.002-13.719
Oaxaca	3.5	2.317-4.704	6.9*	5.319-8.572
Puebla	3.6	2.497-4.712	7.9*	5.608-10.126
Querétaro	6.8	5.133-8.400	12.3*	10.105-14.490
Quintana Roo	11.2	9.355-13.046	15.5	12.315-18.719
San Luis Potosí	3.4	2.302-4.430	7.7*	6.112-9.340
Sinaloa	6.6	4.253-8.921	9.4	7.726-11.170
Sonora	5.5	4.015-6.926	10.9*	8.849-12.866
Tabasco	6.4	4.407-8.474	10.8*	8.957-12.544
Tamaulipas	11.1	8.360-13.763	10.3	8.662-11.942
Tlaxcala	3.0	2.002-3.988	7.1*	5.385-8.893
Veracruz	3.3	2.053-4.544	9.2*	7.329-11.142
Yucatán	4.7	3.146-6.324	11.4*	8.814-13.897
Zacatecas	6.4	4.915-7.871	9.9	7.749-11.971
Nacional	5.7	5.360-6.082	10.3*	9.788-10.813

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

**Cuadro 11B: Consumo último año de cualquier droga.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.4	0.482-2.252	3.7*	2.596-4.876
Baja California	4.3	2.806-5.842	4.5	3.119-5.826
Baja California Sur	2.5	1.187-3.737	3.3	2.161-4.461
Campeche	1.2	---	2.1	1.355-2.935
Chiapas	0.6	0.034-1.113	1.1	0.396-1.863
Chihuahua	3.7	2.542-4.839	3.8	2.686-4.925
Ciudad de México	2.2	1.357-3.011	2.9	1.710-4.107
Coahuila	1.3	0.542-1.968	4.0*	2.723-5.340
Colima	0.3	0.075-0.611	3.1*	1.933-4.170
Durango	2.2	1.166-3.220	3.2	2.104-4.206
Estado de México	0.9	0.523-1.371	2.3*	1.397-3.232
Guanajuato	1.9	1.140-2.711	2.7	1.741-3.661
Guerrero	1.9	0.815-3.080	2.6	1.656-3.477
Hidalgo	4.6	3.073-6.216	2.3	1.453-3.199
Jalisco	1.0	0.381-1.691	5.2*	3.034-7.300
Michoacán	2.4	1.110-3.619	3.8	2.663-4.928
Morelos	0.9	0.296-1.550	2.1	1.130-3.040
Nayarit	2.1	1.026-3.271	3.4	1.773-5.107
Nuevo León	1.8	0.974-2.689	3.1	1.903-4.339
Oaxaca	0.7	0.195-1.228	1.5	0.623-2.380
Puebla	0.7	0.082-1.329	3.2*	1.727-4.619
Querétaro	1.1	0.395-1.803	3.5*	2.319-4.610
Quintana Roo	1.8	1.226-2.394	4.2*	2.921-5.498
San Luis Potosí	0.4	0.074-0.718	2.2*	1.313-3.131
Sinaloa	1.9	0.993-2.840	3.2	2.180-4.277
Sonora	1.8	0.865-2.716	3.1	2.103-4.102
Tabasco	1.5	0.818-2.153	3.1	2.105-4.143
Tamaulipas	3.3	2.105-4.576	2.4	1.441-3.263
Tlaxcala	0.6	---	2.1	1.188-2.942
Veracruz	0.8	0.217-1.366	2.5*	1.505-3.427
Yucatán	1.5	0.553-2.455	1.9	1.028-2.820
Zacatecas	0.9	0.306-1.511	3.0*	1.884-4.062
Nacional	1.6	1.450-1.802	2.9*	2.670-3.216

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo

En 2008, el 5.2% de la población general reportó haber consumido drogas ilegales alguna vez en la vida; este porcentaje aumentó a 9.9% en 2016; en los estados de Colima, Coahuila y Chiapas (de 2.4% a 12.0%, de 3.1% a 10.8% y de 1.7% a 5.8% respectivamente) es donde se observó un mayor aumento proporcional. Asimismo, los estados de Jalisco (15.3%), Quintana Roo (14.9%) y Baja California (13.5%) tienen prevalencias significativamente mayores al promedio nacional (Cuadro 12A).

**Cuadro 12A: Incidencia acumulada del uso de drogas ilegales.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.8	3.420-6.184	11.1*	9.072-13.124
Baja California	9.3	6.791-11.834	13.5	11.538-15.514
Baja California Sur	7.2	5.388-8.939	10.9	8.874-13.000
Campeche	5.0	3.216-6.706	11.5*	8.981-13.972
Chiapas	1.7	0.649-2.720	5.8*	4.134-7.404
Chihuahua	7.5	5.579-9.362	11.7*	9.738-13.725
Ciudad de México	7.8	6.336-9.267	10.3	8.021-12.543
Coahuila	3.1	1.919-4.359	10.8*	8.615-12.924
Colima	2.4	1.436-3.294	12.0*	9.761-14.142
Durango	7.8	5.943-9.675	9.5	7.706-11.305
Estado de México	4.6	3.350-5.875	9.7*	7.597-11.859
Guanajuato	5.7	4.432-7.058	9.6*	7.764-11.476
Guerrero	4.7	3.082-6.279	7.5	5.656-9.293
Hidalgo	8.3	6.084-10.434	7.6	5.848-9.341
Jalisco	5.0	3.580-6.346	15.3*	12.124-18.537
Michoacán	4.3	2.647-5.987	9.0*	7.256-10.644
Morelos	4.1	2.891-5.268	7.5*	5.493-9.449
Nayarit	6.6	4.393-8.745	12.3*	10.053-14.453
Nuevo León	4.1	2.767-5.374	10.6*	8.313-12.894
Oaxaca	3.4	2.198-4.579	6.6*	4.964-8.156
Puebla	3.4	2.336-4.409	7.5*	5.243-9.720
Querétaro	6.7	5.100-8.368	12.1*	9.921-14.262
Quintana Roo	10.1	8.318-11.811	14.9	11.800-17.917
San Luis Potosí	3.0	1.970-4.073	7.5*	5.927-9.146
Sinaloa	6.3	4.057-8.627	9.4	7.657-11.094
Sonora	5.1	3.662-6.482	10.3*	8.349-12.226
Tabasco	5.9	3.926-7.922	10.4*	8.624-12.192
Tamaulipas	10.3	7.733-12.916	10.0	8.319-11.604
Tlaxcala	2.2	1.380-2.969	6.8*	5.071-8.521
Veracruz	2.7	1.560-3.885	8.5*	6.666-10.295
Yucatán	3.9	2.598-5.262	10.8*	8.281-13.296
Zacatecas	6.0	4.615-7.467	9.5	7.433-11.614
Nacional	5.2	4.871-5.565	9.9*	9.372-10.391

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

En cuanto al consumo en el último año, este aumentó de 1.4% a 2.7%; los principales estados que reportan mayor crecimiento proporcional con respecto a 2008 son: Jalisco (de 0.8% a 4.9%), Colima (de 0.2% a 2.9%) y Tlaxcala (de 0.2% a 2%) (Cuadro 12B). El porcentaje de consumo en Baja California (4.4%) se encuentra por encima del promedio nacional, mientras que Oaxaca (1.4%) y Chiapas (1.1%) están por debajo del nacional.

**Cuadro 12B: Consumo último año de drogas ilegales.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.0	0.246-1.779	3.5*	2.406-4.587
Baja California	4.1	2.559-5.593	4.4	3.070-5.774
Baja California Sur	2.5	1.249-3.675	3.3	2.141-4.444
Campeche	1.1	---	1.7	1.036-2.425
Chiapas	0.2	---	1.1	0.340-1.793
Chihuahua	3.3	2.303-4.388	3.4	2.283-4.480
Ciudad de México	1.8	1.063-2.593	2.7	1.561-3.929
Coahuila	1.1	0.445-1.745	3.6*	2.325-4.881
Colima	0.2	0.001-0.321	2.9*	1.821-4.011
Durango	2.0	1.010-3.037	2.7	1.722-3.698
Estado de México	0.9	0.448-1.286	2.1	1.224-2.999
Guanajuato	1.5	0.749-2.188	2.6	1.683-3.561
Guerrero	1.8	0.784-2.849	2.3	1.453-3.176
Hidalgo	4.5	3.003-5.933	2.3	1.396-3.133
Jalisco	0.8	0.161-1.443	4.9*	2.752-6.973
Michoacán	1.8	0.575-2.952	3.4	2.334-4.468
Morelos	0.7	0.101-1.305	2.1	1.130-3.040
Nayarit	1.6	0.573-2.616	2.8	1.382-4.292
Nuevo León	1.8	0.942-2.597	2.8	1.575-3.967
Oaxaca	0.6	0.127-1.052	1.4	0.524-2.224
Puebla	0.7	0.124-1.287	3.0*	1.581-4.433
Querétaro	1.1	0.514-1.684	3.4*	2.203-4.502
Quintana Roo	1.4	0.877-1.836	3.8*	2.520-5.039
San Luis Potosí	0.4	0.071-0.721	2.0*	1.154-2.822
Sinaloa	1.7	0.794-2.536	2.9	1.936-3.944
Sonora	1.5	0.642-2.308	3.0	1.977-3.949
Tabasco	1.5	0.819-2.151	2.9	1.865-3.876
Tamaulipas	3.0	1.814-4.235	2.0	1.249-2.755
Tlaxcala	0.2	0.012-0.452	2.0*	1.088-2.833
Veracruz	0.5	0.079-1.008	1.7	0.927-2.522
Yucatán	1.0	0.328-1.578	1.7	0.825-2.566
Zacatecas	0.9	0.373-1.444	2.6*	1.635-3.634
Nacional	1.4	1.237-1.563	2.7*	2.417-2.947

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo.

En lo que respecta al consumo de marihuana alguna vez en la vida, se observa que se duplicó a nivel nacional, al pasar de 4.2% en 2008 a 8.6% en 2016. En 25 estados se incrementó de manera significativa; sobresalen Colima (de 1.7% a 10.8%), Tlaxcala (de 1.6% a 6.1%) y Chiapas (de 0.8% a 5%), con el mayor crecimiento proporcional (Cuadro 13A). En tanto que en este estudio, el consumo en Quintana Roo, Baja California y Jalisco (con 13.8%, 12.8% y 12.2% respectivamente) supera el promedio nacional.

**Cuadro 13A: Incidencia acumulada de marihuana.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.3	2.193-4.466	9.9*	8.020-11.842
Baja California	7.5	5.152-9.904	12.8*	10.904-14.722
Baja California Sur	6.0	4.419-7.647	9.8*	7.736-11.800
Campeche	4.6	2.886-6.371	9.9*	7.442-12.264
Chiapas	0.8	0.291-1.324	5.0*	3.577-6.472
Chihuahua	6.2	4.596-7.726	10.2*	8.316-12.174
Ciudad de México	6.6	5.271-7.995	9.1	6.983-11.302
Coahuila	2.5	1.423-3.593	9.2*	7.240-11.194
Colima	1.7	0.969-2.492	10.8*	8.678-12.855
Durango	5.8	4.361-7.230	7.8	6.241-9.277
Estado de México	3.9	2.756-5.091	9.0*	6.991-10.919
Guanajuato	3.1	2.115-4.060	8.3*	6.576-10.020
Guerrero	3.4	2.134-4.678	6.0	4.392-7.566
Hidalgo	6.7	4.726-8.766	6.9	5.242-8.625
Jalisco	4.1	2.840-5.267	12.2*	9.614-14.872
Michoacán	3.2	1.692-4.669	8.0*	6.395-9.593
Morelos	3.5	2.394-4.659	6.9*	4.889-8.853
Nayarit	4.8	2.846-6.739	10.9*	8.755-13.082
Nuevo León	3.2	2.122-4.363	9.5*	7.371-11.716
Oaxaca	2.7	1.674-3.764	5.2	3.701-6.623
Puebla	2.8	1.877-3.813	6.3*	4.319-8.209
Querétaro	6.2	4.601-7.847	10.3*	8.328-12.203
Quintana Roo	8.6	7.021-10.248	13.8*	10.772-16.745
San Luis Potosí	2.7	1.744-3.556	6.1*	4.652-7.472
Sinaloa	3.8	2.312-5.324	8.1*	6.430-9.741
Sonora	3.6	2.374-4.918	9.4*	7.636-11.231
Tabasco	5.5	3.696-7.393	8.8	7.054-10.457
Tamaulipas	8.3	6.040-10.566	8.7	7.168-10.208
Tlaxcala	1.6	0.896-2.252	6.1*	4.382-7.755
Veracruz	2.6	1.478-3.680	7.5*	5.758-9.324
Yucatán	3.8	2.484-5.070	10.0*	7.476-12.461
Zacatecas	4.9	3.554-6.297	8.3*	6.298-10.314
Nacional	4.2	3.881-4.496	8.6*	8.184-9.114

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Mientras que el consumo de marihuana en el último año también aumentó significativamente comparado con 2008 (de 1% a 2.1%); los estados de Tlaxcala, Colima y Chiapas fueron los que registraron un mayor crecimiento proporcional al pasar de 0.1% a 1.7%, de 0.2% a 2.3% y de 0.1% a 0.8% respectivamente (Cuadro 13B). El estado de Baja California (3.8%) se ubica por arriba del promedio nacional en 2016.



**Cuadro 13B: Consumo último año de marihuana.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.8	0.140-1.514	3.0*	2.042-4.047
Baja California	3.1	1.828-4.467	3.8	2.608-5.035
Baja California Sur	1.9	0.768-2.976	2.9	1.757-4.012
Campeche	0.7	---	1.2	0.683-1.812
Chiapas	0.1	---	0.8	0.156-1.529
Chihuahua	2.7	1.707-3.718	2.8	1.808-3.876
Ciudad de México	1.7	0.965-2.455	2.5	1.365-3.692
Coahuila	0.7	0.131-1.211	3.2*	1.982-4.488
Colima	0.2	0.001-0.321	2.3*	1.279-3.327
Durango	1.2	0.379-2.052	1.9	1.121-2.700
Estado de México	0.6	0.269-0.946	2.1*	1.202-2.978
Guanajuato	0.5	0.149-0.891	1.9*	1.104-2.789
Guerrero	1.0	0.257-1.814	1.6	0.879-2.296
Hidalgo	3.0	1.896-4.187	1.8	1.000-2.605
Jalisco	0.6	0.062-1.228	2.9*	1.569-4.299
Michoacán	1.0	0.244-1.846	3.0*	1.922-3.987
Morelos	0.4	---	1.9	0.992-2.880
Nayarit	1.4	0.532-2.236	2.3	0.907-3.757
Nuevo León	1.6	0.847-2.325	2.2	1.150-3.179
Oaxaca	0.3	---	1.0	0.349-1.722
Puebla	0.6	0.055-1.207	1.5	0.627-2.441
Querétaro	1.0	0.391-1.542	2.8*	1.688-3.832
Quintana Roo	1.1	0.636-1.491	2.9*	1.749-4.012
San Luis Potosí	0.3	---	1.5	0.801-2.238
Sinaloa	1.0	0.409-1.532	2.5*	1.556-3.414
Sonora	1.2	0.430-1.981	2.8	1.812-3.783
Tabasco	1.2	0.578-1.742	1.9	1.127-2.686
Tamaulipas	2.0	0.898-3.019	1.6	0.940-2.319
Tlaxcala	0.1	---	1.7	0.924-2.516
Veracruz	0.4	0.017-0.876	1.3	0.533-2.011
Yucatán	0.8	0.215-1.420	1.6	0.717-2.421
Zacatecas	0.6	0.116-1.092	2.0*	1.113-2.946
Nacional	1.0	0.888-1.166	2.1*	1.911-2.362

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo.

El consumo de cocaína alguna vez en la vida mostró un aumento significativo de 2.4% en 2008 a 3.5% en 2016% a nivel nacional; en Jalisco, Yucatán y Veracruz, se encontró el mayor crecimiento de este consumo, al pasar de 1.9% a 6.9%, de 0.7% a 3.5%, y de 0.9% a 3.2% respectivamente (Cuadro 14A). Con respecto a 2016, las entidades de Jalisco (6.9%), Chihuahua (6.1%), Quintana Roo (5.8%) y Nayarit (3.9%) reportan porcentajes de consumo superiores al nacional.

**Cuadro 14A: Incidencia acumulada de cocaína.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.6	1.622-3.554	2.7	1.618-3.735
Baja California	3.9	2.624-5.200	4.6	3.136-5.984
Baja California Sur	3.8	2.228-5.319	4.1	3.172-5.107
Campeche	1.7	0.927-2.379	4.0*	2.438-5.621
Chiapas	1.0	0.116-1.918	1.7	0.903-2.517
Chihuahua	4.8	3.416-6.245	6.1	4.407-7.794
Ciudad de México	3.1	2.136-4.103	3.0	1.916-4.166
Coahuila	1.7	0.891-2.496	3.7	2.377-4.962
Colima	1.5	0.780-2.300	4.9*	3.322-6.471
Durango	4.0	2.453-5.450	4.2	2.878-5.459
Estado de México	1.8	1.186-2.513	2.2	1.225-3.163
Guanajuato	2.1	1.007-3.105	3.4	2.253-4.585
Guerrero	3.4	1.921-4.945	3.4	2.148-4.702
Hidalgo	4.0	2.649-5.344	2.3	1.340-3.300
Jalisco	1.9	1.098-2.711	6.9*	4.572-9.301
Michoacán	2.4	0.970-3.793	3.7	2.518-4.884
Morelos	2.0	1.137-2.812	2.1	0.939-3.306
Nayarit	3.9	2.493-5.337	5.7	3.953-7.391
Nuevo León	1.9	0.923-2.869	3.1	1.980-4.246
Oaxaca	1.4	0.620-2.170	2.6	1.471-3.720
Puebla	0.9	0.373-1.444	3.0*	1.673-4.373
Querétaro	2.3	1.198-3.477	4.0	2.838-5.228
Quintana Roo	6.0	4.584-7.444	5.8	4.258-7.244
San Luis Potosí	0.6	0.192-0.927	2.1*	1.274-2.953
Sinaloa	3.7	2.179-5.286	4.7	3.455-5.871
Sonora	2.9	1.834-4.054	4.3	2.920-5.614
Tabasco	2.2	1.155-3.182	4.8*	3.480-6.213
Tamaulipas	6.0	4.441-7.508	3.8	2.623-5.040
Tlaxcala	0.8	0.323-1.319	1.3	0.648-1.865
Veracruz	0.9	0.172-1.719	3.2*	2.211-4.093
Yucatán	0.7	0.183-1.258	3.5*	1.963-5.083
Zacatecas	3.3	2.233-4.410	4.1	2.647-5.510
Nacional	2.4	2.149-2.585	3.5*	3.231-3.819

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.
Cocaína incluye crack.

*Incremento significativo.

Respecto al consumo de cocaína en el último año, se duplica a nivel nacional de 0.4% en 2008 a 0.8% en 2016. Es importante notar a los estados de Jalisco, Querétaro y Oaxaca, que presentan una tendencia de aumento proporcional de este consumo al pasar de 0.1% a 1.9%, de 0.1% a 1% y de 0.1% a 0.7% respectivamente. Asimismo se observa que, en el estado de Hidalgo el consumo disminuyó significativamente, de 2% a 0.5% (Cuadro 14B). En 2016 no hubo aumentos significativos con respecto al promedio nacional, pero en los estados de Colima (0.3%), San Luis Potosí (0.2%) Tlaxcala (0.2%) y Chiapas (0.2%) el consumo se ubicó por debajo del promedio.

**Cuadro 14B: Consumo en el último año de cocaína.
Población de 12 a 65 años.**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.2	---	0.5	0.041-0.981
Baja California	0.6	0.112-1.169	0.6	0.055-1.107
Baja California Sur	0.7	---	0.3	---
Campeche	0.4	---	0.7	0.196-1.169
Chiapas	0.1	---	0.2	---
Chihuahua	1.4	0.622-2.142	1.1	0.376-1.754
Ciudad de México	0.3	---	0.6	---
Coahuila	0.6	0.140-1.008	1.0	0.206-1.704
Colima	--	---	0.3	---
Durango	0.7	0.044-1.455	0.8	0.308-1.209
Estado de México	0.2	0.060-0.345	0.6	0.118-1.015
Guanajuato	0.6	0.104-1.136	0.9	0.327-1.463
Guerrero	1.4	0.423-2.350	1.1	0.423-1.706
Hidalgo	2.0	1.033-2.922	0.5**	0.104-0.944
Jalisco	0.1	---	1.9	0.151-3.651
Michoacán	0.7	---	0.9	0.297-1.531
Morelos	0.3	---	0.3	0.029-0.635
Nayarit	0.5	0.098-0.890	0.7	0.043-1.315
Nuevo León	0.3	0.005-0.571	0.9	0.122-1.592
Oaxaca	0.1	---	0.7	---
Puebla	--	---	1.3	0.356-2.316
Querétaro	0.1	---	1.0	0.418-1.608
Quintana Roo	0.6	0.291-0.931	1.6	0.802-2.402
San Luis Potosí	0.1	---	0.2	0.002-0.423
Sinaloa	1.1	0.370-1.753	0.8	0.271-1.315
Sonora	0.4	---	0.9	0.226-1.559
Tabasco	0.5	0.124-0.853	1.4	0.600-2.185
Tamaulipas	1.4	0.683-2.192	0.6	0.184-0.943
Tlaxcala	0.1	---	0.2	---
Veracruz	0.1	---	0.5	0.125-0.870
Yucatán	0.2	---	0.6	0.057-1.049
Zacatecas	0.2	---	0.9	0.307-1.561
Nacional	0.4	0.356-0.523	0.8*	0.632-0.971

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.
Cocaína incluye crack.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo.

**Decremento significativo.

Dificultades relacionadas al consumo de drogas

Esta sección se evaluó con una escala de 0 a 10, donde 0 representa ninguna dificultad y 10 una dificultad muy grave. En general los datos indican cómo en la medida en que la población muestra una mayor problemática o dependencia al consumo de drogas médicas e ilegales, se presenta una mayor dificultad ante ciertas situaciones cotidianas o se tienen más días perdidos.



**Cuadro 15: Dificultades Relacionadas al Consumo de Drogas.
Población de 12 a 65 años**

Dificultades*	Hombres						Mujeres					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	\bar{X}	D.E										
En las tareas domésticas												
Consumidores con Dependencia	3.9	3.2	3.8	2.8	3.6	2.7	2.7	2.4	3.7	3.2	3.3	1.8
Consumidores Regulares	1.9	2.2	1.7	2.1	1.1	1.6	1.4	1.8	2.7	3.9	1.0	2.0
Consumidores Experimentales	1.2	1.8	1.0	1.4	0.7	1.4	0.9	1.2	0.6	1.5	0.4	0.7
En su capacidad para trabajar o estudiar												
Consumidores con Dependencia	3.4	2.9	4.0	3.3	3.4	2.7	3.8	3.6	3.1	2.9	2.7	1.8
Consumidores Regulares	2.2	2.8	2.1	2.6	1.5	2.1	1.5	2.0	1.9	2.3	0.4	0.7
Consumidores Experimentales	1.4	2.3	1.8	3.1	1.0	1.5	1.3	2.1	1.1	2.3	0.6	1.4
Para iniciar o mantener relaciones estrechas												
Consumidores con Dependencia	2.8	2.9	3.6	3.0	3.9	3.1	3.2	3.3	2.4	2.6	0.4	2.0
Consumidores Regulares	2.0	2.4	1.9	2.5	1.2	1.9	1.6	2.5	2.1	2.2	0.8	1.5
Consumidores Experimentales	1.3	2.1	1.7	2.7	1.3	1.8	1.1	2.0	0.8	2.0	1.1	2.9
En su vida social												
Consumidores con Dependencia	3.8	3.4	4.2	3.1	4.2	3.2	3.1	3.2	2.8	3.1	0.4	2.0
Consumidores Regulares	2.3	2.9	2.2	2.8	1.5	2.1	1.4	2.4	1.8	1.8	0.6	1.9
Consumidores Experimentales	1.6	2.5	1.8	2.6	1.5	1.9	1.6	2.2	0.7	2.0	1.0	2.4
Días perdidos en los últimos 12 meses**												
Consumidores con Dependencia	13.1	40.2	38.5	93.2	22.9	67.8	13.6	32.7	23.0	35.7	15.7	7.9
Consumidores Regulares	15.0	62.4	5.5	36.6	1.2	8.8	0.8	1.7	0.4	1.8	6.9	48.3
Consumidores Experimentales	2.2	17.8	8.1	38.8	3.7	15.2	16.1	71.3	0.4	1.7	0.2	0.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Media de puntuación de una escala de 0 a 10.

**Media de días perdidos debido al consumo de drogas.



Para la población con dependencia, los datos encontrados en esta sección indican que los hombres de 12 a 17 años mencionan como principal dificultad a las tareas domésticas ($\bar{X} = 3.9$), mientras que en las mujeres son las dificultades en su capacidad de trabajar o estudiar ($\bar{X} = 3.8$).

En la población de 18 a 34 años de edad, los hombres reportan una media de 4.2 en dificultades en su vida social, y las mujeres una media de 3.7 en dificultad al realizar sus tareas domésticas. Estas mismas dificultades se encontraron para hombres y mujeres en la población de 35 a 65 años (hombres: $\bar{X} = 4.2$ en dificultades en su vida social; mujeres: $\bar{X} = 3.3$ en tareas domésticas).

En cuanto al número de días perdidos por su consumo de drogas, los hombres y mujeres de 18 a 34 años fueron quienes más número de días perdidos reportaron (38.5 y 23 días), seguido de hombres y mujeres de 35 a 65 años (22.9 y 15.7 días respectivamente); mientras que los de 12 a 17 años fueron quienes mostraron menos días perdidos (13.1 días hombres y 13.6 días mujeres) (Cuadro 15).

Tratamiento y necesidades de atención

De los consumidores de drogas en el último año, el 8% ha acudido a tratamiento (9.3% hombres y 3.9% mujeres); en tanto, en quienes reportaron dependencia en el último año, el 20.4% ha asistido a tratamiento (22.1% hombres y 12.8% mujeres) (Cuadro 16).

**Cuadro 16: Consumidores de drogas que han recibido tratamiento.
Población de 12 a 65 años**

	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total	200 110	8.0	111 002	20.4
Hombres	177 003	9.3	98 343	22.1
Mujeres	23 107	3.9	12 659	12.8

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Respecto al tipo de tratamiento, de quienes presentan dependencia en el último año, más de la mitad de los hombres acude a tratamiento residencial o consulta externa (54.2%), seguido de estancia en un anexo (53%) y tratamiento por desintoxicación (51.1%). En las mujeres estos porcentajes se reducen a 31.5% en tratamiento por desintoxicación y 22.9% tanto en tratamiento residencial como en estancia en un anexo (Cuadro 17).

Cerca de una cuarta parte de los consumidores de drogas en los últimos 12 meses (21.4%) y de las personas con dependencia en el último año (24.5%) completaron el tratamiento con algún profesional de la salud; en tanto que casi tres cuartas partes sólo lo hicieron en forma parcial (70.1% de los consumidores en el último año y 72.4% de los consumidores con dependencia en el último año). En los hombres se observa una situación similar, donde el menor porcentaje se encuentra entre quienes completaron el tratamiento (17.6% consumidores último año y 19.8% consumidores con dependencia en el último año); mientras que en la mujeres este patrón se invierte y el menor porcentaje se encuentra entre quienes sólo cubrieron de manera parcial el tratamiento con algún



profesional de la salud (42.6% con consumo en el último año y 9.5% con dependencia en el último año) (Cuadro 18).

**Cuadro 17: Tipo de tratamiento recibido por los consumidores de drogas.
Población de 12 a 65 años**

Tratamiento	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total				
Desintoxicación	93 919	46.9	54 250	48.9
Residencial	81 008	40.5	56 237	50.7
Ambulatorio	45 472	22.7	25 621	23.1
Por internet	23 322	11.7	14 189	12.8
Clínica de metadona	14 233	7.1	12 370	11.1
Anexo	86 242	43.1	55 029	49.6
Hombres				
Desintoxicación	85 447	48.3	50 259	51.1
Residencial	75 146	42.5	53 335	54.2
Ambulatorio	42 506	24.0	23 155	23.5
Por internet	23 322	13.2	14 189	14.4
Clínica de metadona	13 874	7.8	12 174	12.4
Anexo	78 368	44.3	52 130	53.0
Mujeres				
Desintoxicación	8 471	36.7	3 991	31.5
Residencial	5 862	25.4	2 902	22.9
Ambulatorio	2 966	12.8	2 466	19.5
Por internet	--	--	--	--
Clínica de metadona	359	1.6	196	1.5
Anexo	7 874	34.1	2 898	22.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

**Cuadro 18: Tipo de tratamiento recibido por los consumidores de drogas.
Población de 12 a 65 años**

Tratamiento	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total				
Completo con profesionista	21 908	21.4	14 912	24.5
Parcial con profesionista	71 716	70.1	44 015	72.4
Autoayuda	8 707	8.5	1 867	3.1
Otro tipo	--	--	--	--
Hombres				
Completo con profesionista	16 254	17.6	11 230	19.8
Parcial con profesionista	67 518	73.0	43 629	76.9
Autoayuda	8 707	9.4	1 867	3.3
Otro tipo	--	--	--	--
Mujeres				
Completo con profesionista	5 653	57.4	3 682	90.5
Parcial con profesionista	4 198	42.6	386	9.5
Autoayuda	--	--	--	--
Otro tipo	--	--	--	--

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

**Cuadro 19: Consumidores de drogas que consultaron a algún profesional de la salud.
Población de 12 a 65 años**

Profesional al que acudió	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total				
Psiquiatra	55 096	27.5	38 017	34.2
Médico familiar o general	56 979	28.5	39 312	35.4
Otro médico especialista	31 967	16.0	22 394	20.2
Psicólogo	80 668	40.3	53 373	48.1
Trabajadora Social	50 849	25.4	32 666	29.4
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	47 821	23.9	34 216	30.8
Terapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	36 249	18.1	24 590	22.2
Consejero espiritual	49 251	24.6	33 411	30.1
Grupo de autoayuda	67 028	33.5	40 638	36.6
Consultó a algún otro especialista	11 222	5.6	11 222	10.1
Hombres				
Psiquiatra	52 038	29.4	37 432	38.1
Médico familiar o general	53 869	30.4	37 571	38.2
Otro médico especialista	31 566	17.8	22 394	22.8
Psicólogo	73 021	41.3	49 692	50.5
Trabajadora Social	45 793	25.9	30 725	31.2
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	45 232	25.6	32 275	32.8
Terapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	34 308	19.4	22 649	23.0
Consejero espiritual	46 810	26.4	31 471	32.0
Grupo de autoayuda	65 740	37.1	40 252	40.9
Consultó a algún otro especialista	11 222	6.3	11 222	11.4
Mujeres				
Psiquiatra	3 058	13.2	586	4.6
Médico familiar o general	3 110	13.5	1 741	13.8
Otro médico especialista	401	1.7	--	--
Psicólogo	7 647	33.1	3 682	29.1
Trabajadora Social	5 056	21.9	1 941	15.3
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	2 589	11.2	1 941	15.3
Terapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	1 941	8.4	1 941	15.3
Consejero espiritual	2 441	10.6	1 940	15.3
Grupo de autoayuda	1 288	5.6	386	3.0
Consultó a algún otro especialista	--	--	--	--

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.



En general, los consumidores de drogas en el último año acuden a consultar a un psicólogo (40.3%), seguido de grupos de autoayuda (33.5%) y médico familiar o general (28.5%); esto es similar en los hombres (41.3%, 37.1% y 30.4%); en tanto que las mujeres acuden con el psicólogo (33.1%), trabajadores sociales (21.9%) y médicos familiares o generales (13.5%) (Cuadro 19).

Finalmente, al analizar las necesidades de atención por el consumo de drogas para la población total (Cuadro 20), se observa que el 0.6% de los consumidores con dependencia y 9.7% de los consumidores sin dependencia requieren algún tipo de ayuda por el consumo, mientras que en la población de 12 a 17 años, estos porcentajes son 0.6% y 5.8% respectivamente.

Es de suma importancia promover campañas de prevención en los adolescentes que han estado expuestos al consumo (16.5%) y en los que nunca han consumidos drogas (77.1%).

**Cuadro 20: Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas.
Población de 12 a 65 años**

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	445 798	1.1	99 073	0.2	544 870	0.6
Uso sin dependencia	6 203 419	15.1	2 033 927	4.6	8 237 345	9.7
Exposición a drogas sin consumo	10 599 504	25.7	4 748 302	10.8	15 347 806	18.0
No consumo	23 919 896	58.1	37 212 140	84.4	61 132 036	71.7

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Factores relacionados con el consumo de drogas

a) Percepción de riesgo y tolerancia social


Al analizar la percepción de riesgo de los no consumidores de drogas en la población total, el 71.3% considera muy peligroso el consumo de cocaína, 70.7% el de inhalables y el 39.9% el de marihuana; en tanto que la percepción de riesgo disminuye en los consumidores de drogas (62.8%, 66.9% y 18.7% respectivamente). Cabe resaltar el bajo porcentaje de percepción de riesgo de consumir marihuana en comparación con las demás drogas (cocaína e inhalables), tanto en población consumidora como no consumidora.

Por sexo, los hombres no consumidores reportan porcentajes menores (69.5% cocaína, 35.7% marihuana, 69.0% inhalables) que las mujeres (72.7%, 43.4% y 72.1% respectivamente). Situación que es similar en los consumidores de drogas (Gráfica 3).

En la población de 12 a 17 años, el 69.1% que no ha consumido drogas considera muy peligroso el consumo de cocaína, 67.6% para los inhalables y 50.7% para el consumo de marihuana, mientras que en los consumidores de drogas, la percepción de riesgo disminuye: inhalables (52.6%), cocaína



(51.3%) y mariguana (19.9%). Situación similar presentan hombres y mujeres, ya que la percepción de riesgo es más alta en los no consumidores de drogas y disminuye para los consumidores.




Con respecto a la tolerancia social, en la población de 12 a 17 años que ha consumido drogas se observa una baja tolerancia de la familia hacia el consumo de drogas, (3% hombres y 1.5% mujeres), y es más baja en los no consumidores (0.6% ambos sexos). La tolerancia del mejor amigo(a) ante el consumo es de 27% hombres y 27.4% mujeres en los adolescentes consumidores de drogas y de 11.2% hombres y 9.2% mujeres no consumidores (Gráfica 4).

En la población de 18 a 34 años, el 4.4% de hombres y el 1.6% de mujeres que consumen drogas, consideran que sus familiares son tolerantes ante el consumo, mientras que en los no consumidores es menor el porcentaje (1.4% hombres y 0.8% mujeres). Situación diferente ocurre con el mejor amigo(a), donde la tolerancia hacia el consumo es mayor tanto en los no consumidores (11.2% hombres y 6.4% mujeres) como en los consumidores de drogas (29.2% hombres y 22.3% mujeres) (Gráfica 4).

En los consumidores de drogas de 35 a 65 años se reporta una tolerancia de la familia hacia el consumo de drogas de 3.1% en hombres y 5.1% en mujeres; mientras que en los no consumidores la tolerancia es de 1.3% en hombres y 0.9% en mujeres. En el caso del mejor amigo(a), la tolerancia ante el consumo de drogas es de 17% hombres y 9.8% mujeres en los consumidores y de 8.6% y 3% respectivamente en los no consumidores (Gráfica 4).




Gráfica 4. Tolerancia Social hacia el Consumo de Drogas



b) Exposición al consumo de drogas

De la población que ha estado expuesta a drogas, sea que se las hayan ofrecido regaladas o vendidas, el 32.2% ha consumido cualquier droga alguna vez, el 28.4% ha consumido marihuana, el 10.7% cocaína y el 3.6% inhalables; en quienes no han estado expuestos al consumo el 2.4% ha consumido cualquier droga, el 1.5% marihuana, el 0.6% cocaína y el 0.2% inhalables.

Gráfica 5. Exposición al Consumo de Drogas Población de 12 a 65 años



Por sexo, se observa que los hombres que han estado expuestos a drogas, el 35% reporta haber consumido cualquier droga, marihuana el 31.2%, cocaína el 12.7% e inhalables el 3.8%. Situación




diferente se presenta entre quienes no han estado expuestos donde el consumo de cualquier droga es de 3.8%, marihuana 2.6%, cocaína 1.2% e inhalables 0.3%. En el caso de las mujeres, de aquellas expuestas a drogas el 25.1% ha consumido cualquier droga, el 21.2% marihuana, 5.7% cocaína y 3.2% inhalables alguna vez; estas cifras disminuyen en las no expuestas, pues apenas el 1.4% ha consumido cualquier droga, 0.7% marihuana, 0.2% cocaína y 0.1% inhalables (Gráfica 5).

c) Exposición a la prevención

De la población total que ha estado expuesta a la prevención antes de consumir drogas, el 5.1% consume cualquier droga; los hombres reportan un porcentaje mayor (8.1%) que el de las mujeres (3.2%). En contraste, quienes no han estado expuestos a prevención, los porcentaje de consumo se duplican (12.3% población total; 18.4% hombres y 5.6% mujeres) (Gráfica 6).

De la población entre 12 y 17 años que ha participado en alguna actividad para prevenir el consumo de drogas, el 3.3% reporta consumo de cualquier droga alguna vez, 3.5% hombres y 3.1% mujeres, porcentaje de consumo que crece 3 veces (10.3% población total, 10.1% hombres y 10.6% mujeres) en el grupo que no ha estado expuesto a programas de prevención (Gráfica 6).



En la población de 18 a 34 años, el 8.1% que ha recibido información sobre prevención del consumo de drogas reporta haber consumido cualquier droga alguna vez; los hombres presentan un porcentaje



de consumo de 13.7% y las mujeres de 4.8% en tanto que el 17.4% de la población sin exposición a prevención ha consumido cualquier droga alguna vez (hombres 25.2%, mujeres 8.9%) (Gráfica 6).

En la población de 35 a 65 años, el 3.2% de quien ha estado expuesto a la prevención presenta consumo de cualquier droga alguna vez; (7.8% de los hombres y 1.3% de las mujeres). Los porcentajes de consumo se duplican en quienes no han participado en programas preventivos tanto en población total (8.4%) y hombres (14.6%), mientras que en mujeres se mantienen estable (2%) (Gráfica 6).

Si bien vemos que hay una relación entre estar expuesta a prevención con prevalencias menores de consumo, es importante analizar a detalle el tipo de prevención y hacer análisis de la calidad de dichas actividades de prevención.



RESUMEN DE RESULTADOS

Prevalencias y tendencias del consumo de drogas

En la población total creció el consumo de cualquier droga, drogas ilegales y marihuana tanto para alguna vez (de 7.8% a 10.3%, de 7.2% a 9.9% y de 6% a 8.6% respectivamente) como para el último año (de 1.8% a 2.9%, 1.5% a 2.7% y de 1.2% a 2.1% respectivamente), mientras que el consumo de crack, alucinógenos, inhalables, heroína y metanfetaminas se mantiene sin cambios estadísticamente significativos.

En hombres incrementaron las mismas sustancias para alguna vez (cualquier droga de 13% a 16.2%, drogas ilegales de 12.5% a 15.8% y marihuana de 10.6% a 14%) y para último año (cualquier droga de 3% a 4.6%, drogas ilegales de 2.6% a 4.4% y marihuana de 2.2% a 3.5%). Sin embargo, es relevante hacer notar que proporcionalmente, el crecimiento es mucho más evidente en las mujeres, pues el consumo de marihuana alguna vez se duplicó (de 1.6% a 3.7%) y el de último año se triplicó (de 0.3% a 0.9%) al igual que el de cualquier droga y drogas ilegales último año (de 0.7% a 1.3% y de 0.4 a 1.1% respectivamente).

Por otro lado, la prevalencia de dependencia a drogas en el último año en la población es de 0.6% (1.1% en hombres y 0.2% en mujeres). Se debe observar que los hombres de 18 a 34 años tienen una prevalencia 6.6 veces mayor que las mujeres de esa misma edad (2% y 0.3% respectivamente).

La media en la edad de inicio del consumo de drogas ha disminuido en el transcurso del tiempo (20.6 años en 2002, 18.7 en 2008, 18.8 en 2011 y 17.8 en 2016).

Tendencias regionales del consumo de drogas (Encuestas 2011-2016)

En las regiones Occidental, Norcentral, Sur y Centro se presentaron los mayores incrementos con respecto a 2011 en el consumo alguna vez de cualquier droga (de 10.3% a 14.4%; de 8.4 a 11.5%; de 5.3% a 9.6% y de 6.6% a 9.4% respectivamente), drogas ilegales (de 9.2% a 13.7%; 7.3% a 10.9%; de 5% a 9.3% y de 6.2% a 9.1%). En el caso del consumo de marihuana alguna vez, nuevamente se encuentran las regiones Occidental (de 6.8% a 11.3%), Norcentral (de 5.9% a 9.4%), Sur (de 4.6% a 8.3%), Centro (de 5.2% a 8.1%) y se agrega la región Noroccidental (de 7.4% a 10.2%) como las que tuvieron los mayores aumentos en el consumo, mientras que en el consumo de cocaína, se mantuvo estable.

En cuanto a la prevalencia de último año de cualquier droga, las regiones Occidental (de 2% a 4.5%), Norcentral (de 2% a 3.8%) y Sur (de 0.8% a 2.2%) presentan los mayores incrementos con respecto a 2011; para drogas ilegales (de 1.5% a 4.1%, de 1.6% a 3.3% y de 0.6% a 2%, respectivamente) y marihuana (de 1.3% a 2.7%; de 1% a 2.8% y de 0.5% a 1.5%), además de la región Centro (de 1.2% a 2.4%) para drogas ilegales.



Tendencias y variaciones estatales del consumo de drogas (Encuestas 2008-2016)

El consumo de cualquier droga en el último año pasó de 1.6% en 2008 a 2.9% en 2016. Los estados que presentaron el mayor crecimiento proporcional fueron: Jalisco (de 1% a 5.2%), Colima (de 0.3% a 3.1%) y San Luis Potosí (de 0.4% a 2.2%). En relación a este estudio, los estados mostraron porcentajes de consumo dentro del promedio nacional (2.9%) excepto Oaxaca (1.5%) y Chiapas (1.1%), cuyo porcentaje de consumo es menor al nacional (2.9%).

En 2008 el 1.4% de la población reportó consumo drogas ilegales en el último año, para 2016 casi se duplicó a 2.7%. El mayor crecimiento proporcional se presentó en Jalisco, Colima y Tlaxcala. En tanto que el estado de Baja California (4.4%) presentó una prevalencia por arriba del porcentaje nacional en 2016.

En cuanto al consumo de marihuana en el último año, se duplicó al pasar de 1% a 2.1%. Los estados con mayores incrementos proporcionales fueron Coahuila (0.7% a 3.2%), Jalisco (0.6% a 2.9%) y Colima (0.2% a 2.3%). Mientras que Baja California (3.8%) se ubica por arriba del promedio nacional en 2016 (2.1%).

En cuanto al consumo de cocaína en el último año se duplicó de 0.4% en 2008 a 0.8% en 2016; Jalisco, Querétaro y Oaxaca, que presentan una tendencia de aumento proporcional de este consumo al pasar de 0.1% a 1.9%, de 0.1% a 1% y de 0.1% a 0.7% respectivamente. En 2016 no hubo aumentos significativos con respecto al promedio nacional, pero en los estados de Colima (0.3%), San Luis Potosí (0.2%) Tlaxcala (0.2%) y Chiapas (0.2%) el consumo se ubicó por debajo del promedio.

Dificultades relacionadas al consumo de drogas

Los hombres de 12 a 17 años que reportan dependencia mencionan en primer lugar la dificultad de realizar tareas domésticas (\bar{X} = 3.9), mientras que las mujeres mencionan dificultades en su capacidad de trabajar o estudiar (\bar{X} = 3.8); los hombres de 18 a 34 años reportaron dificultades en su vida social (\bar{X} = 4.2) mientras que en mujeres mencionan dificultades para realizar tareas domésticas (\bar{X} = 3.7). En aquellos de 35 a 65 años, los hombres mencionaron dificultades en su vida social (\bar{X} = 4.2) y las mujeres problemas para las tareas domésticas (\bar{X} = 3.3).

La población de 18 a 34 años con dependencia tuvo el mayor número de días perdidos al año (38.5 días hombres y 23 días mujeres) debido a su consumo de drogas.

Tratamiento y necesidades de atención

De los consumidores de drogas, el 8% ha acudido a tratamiento (9.3% hombres y 3.9% mujeres); en tanto que de los consumidores con dependencia en el último año, la prevalencia es de 20.4% (22.1% hombres y 12.8% mujeres).

El 21.4% de los consumidores de drogas en los últimos 12 meses y 24.5% de las personas con dependencia en el último año completaron el tratamiento con algún profesional de la salud.



En la población de 12 a 17 años, el 0.6% y el 5.8% de los consumidores con dependencia y sin dependencia respectivamente requieren algún tipo de ayuda por su consumo. Por sexo, el 0.7% de hombres y 0.5% de mujeres con dependencia y el 5.9% de hombres y 5.6% de mujeres sin dependencia requieren de ayuda por su consumo de drogas

Factores relacionados con el consumo de drogas

Los resultados indican una mayor percepción de riesgo en quienes no consumen drogas. Así, de la población total sin consumo de drogas, el 71.3% considera muy peligroso el consumo de cocaína, el 70.7% el de inhalables y el 39.9% el de mariguana; esta percepción de riesgo disminuye en el grupo de consumidores de drogas (62.8%, 66.9% y 18.7% respectivamente).

Algo similar ocurre con la población menor de edad de 12 a 17 años, de manera que el 69.1% de quienes no han consumido drogas considera muy peligroso el consumo de cocaína, 67.6% el consumo de inhalables y 50.7% la mariguana, en los consumidores de drogas, la percepción de riesgo se reduce: cocaína (51.3%), inhalables (52.6%) y mariguana (19.9%).


En general, la tolerancia social de la familia hacia el consumo de drogas es baja, y es un poco más aceptada en los consumidores, situación que es aún más laxa cuando se considera la tolerancia social de los amigos. De esta manera, en adolescentes de 12 a 17 años que han consumido drogas, la tolerancia de la familia hacia el consumo es de 3% en hombres y 1.5% en mujeres, en los no consumidores es de 0.6% tanto en hombres como en mujeres. La tolerancia del mejor amigo(a) es de 27% en hombres y 27.4% en mujeres en el caso de los consumidores y de 11.2% en hombres y 9.2% en mujeres en los no consumidores.

Sin duda la exposición al consumo de drogas es un factor que afecta la decisión de consumir drogas, de manera que de la población expuesta, el 32.2% ha consumido alguna sustancia, el 28.4% mariguana, el 10.7% cocaína y el 3.6% inhalables, cifras que son menores para quienes no se les han ofrecido drogas.

La exposición a algún tipo de prevención ha funcionado, de manera que los consumos de sustancias son menores en esta población cuando se realizó antes de consumirlas. No obstante, es necesaria mayor información sobre el tema y sobre todo, realizar evaluaciones sistemáticas de las intervenciones, con objeto de contar con intervenciones basadas en evidencia. Los datos indican que en los adolescentes de 12 a 17 años que han recibido algún tipo de prevención, el 3.3% reporta consumo de cualquier droga, en comparación con los que no la recibieron que es de 10.3%.



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS





CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Los resultados de este estudio nos indican que en México, en la población de 12 a 65 años, el consumo de drogas aún es bajo en comparación con otros países; no obstante, se mantiene un crecimiento sostenido, en particular cuando se analiza el consumo en el último año de cualquier droga, de las drogas ilegales y de la marihuana por separado. El consumo de otras drogas (inhalables, cocaína, alucinógenos y estimulantes tipo anfetamínico) se mantiene estable desde la medición de 2011, aunque el consumo muestra un aumento constante desde 2002, principalmente el de cocaína.

Los principales crecimientos en el consumo se dan en la población de 12 a 17 años, y de 18 a los 34 años. Al analizar los datos según sexo, en la población femenina se observaron menores prevalencias, pero en ellas se tienen los mayores incrementos proporcionales.

Las drogas siguen teniendo un inicio temprano 17.7 años en los hombres y 18.2 en las mujeres, con pocos nuevos casos después de los 35 años. Este estudio muestra una reducción en la edad de inicio en comparación con la medición de 2011, donde en las mujeres la edad de inicio disminuyó de 20.1 años a 18.2; en tanto que para los hombres el cambio fue menor, de 18.5 a 17.7 años. Este cambio, entre otros elementos, indica el crecimiento en la prevalencia del consumo de drogas de las nuevas generaciones, lo cual es un fenómeno que debe monitorearse y reforzar la postergación del inicio a través de programas orientados a tal fin o de nuevas acciones que conduzca a evitar el consumo o a aplazarlo.

La marihuana es la droga que mayor crecimiento ha tenido, tanto en hombres como en mujeres. En este incremento interviene la percepción de riesgo del consumo de marihuana que ha disminuido por debajo del 40%, cuando en otras sustancias como la cocaína o los inhalables alcanza valores mayores al 62%. De manera particular, esta situación se observa en la Ciudad de México donde apenas el 26% percibe como muy peligroso el consumo de esta sustancia.

Sin duda, es un área relevante para trabajar en los programas de prevención ya que diversos estudios han reportado que la percepción de riesgo está altamente relacionada con el consumo⁹.

Otro factor importante es el grupo de amistades, de manera que en aquellos donde se tiene mayor tolerancia ante el consumo, se observan mayores prevalencias de consumo, tanto en hombres como en mujeres.

El ofrecimiento de alguna droga, sea vendida o regalada, es otro factor que involucra no sólo al grupo de pares, sino tiene que ver con el entorno que rodea al individuo y a sus familias. En este ámbito los resultados muestran que uno de cada tres hombres a quienes se les ha ofrecido drogas la llegan a consumir; además esta prevalencia es casi diez veces menor en quienes no han sido expuestos a ella. Los datos son similares para las mujeres.

Esto implica, por la parte normativa y de seguridad, que deben cuidarse los entornos escolares y de recreación familiar por parte de las autoridades encargadas de ello, con objeto de disminuir la disponibilidad de sustancias y su ofrecimiento, y así contar con espacios de convivencia y recreación más seguros.



Por lo que respecta a los cambios en los estados, en muchos de ellos se registra un incremento similar al nacional. Las entidades que actualmente muestran los mayores consumos son Jalisco, Baja California y Quintana Roo en cualquier droga, drogas ilegales y mariguana. Si incluimos a la cocaína en el escenario, se agregan Chihuahua y Nayarit. Este elemento debe ayudar a dirigir acciones específicas de prevención basada en evidencia en estos estados, con objeto de contener y disminuir las tasas de consumo de sus habitantes.

La información de la encuesta nos ha permitido conocer algunas de las áreas de la vida que se ven afectadas en los consumidores, en particular en los dependientes, quienes mencionan verse perjudicados en su vida social, en la realización de tareas domésticas y en su capacidad para trabajar o estudiar. Adicionalmente, este segmento de la población indica que debido a su consumo fueron incapaces de realizar sus actividades habituales o de trabajar un promedio de 30.8 días de un año. De manera particular, los hombres entre 18 y 34 años reportan el mayor número de días de incapacidad con una media de 38.5. Estos datos muestran cómo el consumo de drogas puede imposibilitar al individuo o separarlo de sus actividades cotidianas al afectar sus relaciones personales, sociales o disminuir su capacidad económica.

Por otro lado, observamos en los datos que apenas el 20.4% de la población que presenta dependencia y 8% de los que han consumido drogas en el último año, acude a tratamiento. Sin duda, la necesidad de facilitar el acceso a tratamiento a la población que lo requiere, es una acción imperativa para las personas que trabajamos en esta área. Identificar claramente las barreras de acceso, sean económicas, de distancias, de calidad del servicio o del tiempo que tiene disponible la persona usuaria, es una tarea necesaria para disminuir los obstáculos y abrir caminos para la atención de los problemas que genera el consumo de drogas.

Sin embargo, no son los únicos elementos a considerar. Hay que hacer notar a los consumidores cómo las drogas afectan su salud, sus actividades cotidianas, así como el entorno personal en el que se desenvuelve. Este punto es difícil ya que es necesario resaltar la problemática social, personal y de salud que su consumo puede ocasionarles.

También es relevante trabajar más con la población en general para que perciba el consumo de drogas como un problema de salud y no como un acto delictivo de quien consume drogas, así como disminuir el estigma que se tiene sobre el consumo, en particular hacia las mujeres consumidoras. ¿Por qué las mujeres? Los datos indican que son ellas quienes menos asisten a tratamiento. Además, las que llegan a asistir van principalmente a terapias individuales y no a grupales como ocurre con los hombres y esto quizá se deba al estigma y hostigamiento que se presenta hacia ellas. Ello puede facilitar que no se concluya el tratamiento y posiblemente a no buscar otras opciones, derivado de la experiencia vivida.